



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Nam Bộ dao động từ 22 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 39.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 35.8\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 97.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-31/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.8	23.0	26.4	67.9
Trong tuần	30.3	22.0	26.2	107.6
Tuần tới	29.0-32.0	20.0-23.0	24.5-27.5	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa (Đông xuân 2022 - 2023)	Mạ, đẻ nhánh, đòng-trỗ	<p>Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ <math>22.0-30.3^{\circ}\text{C}</math>, nhiệt độ không khí trung bình <math>26.2^{\circ}\text{C}</math>, tổng lượng mưa là 107.6mm. Từ lúc lúa đẻ nhánh cho đến khi lúa bắt đầu đứng cái làm đòng người dân cần áp dụng biện pháp “ướt - khô xen kẽ”. Tức là để nước vào ruộng khoảng 5cm rồi để nước tự cạn cho tới khi mặt ruộng nứt nhẹ thì cho nước vào lại. Cứ như thế trong suốt quá trình lúa đẻ nhánh.</p> <p>Giai đoạn này cần chú ý: Rầy nâu gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng- trỗ; Bệnh đạo ôn, bạc lá vi khuẩn, bệnh lem lép hạt có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm và mức độ hại tại trà lúa giai đoạn trỗ - chín; Ốc bươu vàng gây hại trên những ruộng mới gieo sạ</p>

Cây trồng	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Nhãn	Chăm sóc sau thu hoạch	Điều kiện thời tiết tuần này không thay đổi nhiều so với tuần trước. Trong giai đoạn này cần tiến hành cắt tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành khô, cành ốm yếu, cành vượt che khuất ánh sáng và những cành mọc “là xà” mặt đất (để tránh bệnh nứt thân xì mũ). Sau khi tỉa cành, cần sát khuẩn, rửa vết cắt, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của nấm khuẩn. Trong giai đoạn này cần bón phân để cho cây phục hồi; ngoài ra cần lưu ý: Bệnh chổi rồng nhãn, sâu đo, sâu cuốn tổ, bọ xít nâu .... tiếp tục hại.
Cây xoài	Ra hoa- nuôi quả- thu hoạch	Cây xoài trái vụ đang trong giai đoạn ra hoa, nuôi quả, cần bón phân để tăng chất lượng cho quả. Trong giai đoạn này của cây xoài cần lưu ý: các loại kiến, bọ xít, bệnh thán thư, phấn trắng, xỉ mù thân gây hại cho Xoài ở các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, ...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)	Đang trong nhiều giai đoạn	Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0-30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: Nhện đỏ hại tăng; ruồi đục quả, rệp sáp, rệp muội, bệnh muội đen, bệnh sẹo, bệnh loét tiếp tục hại. Bệnh greening, chảy gôm, vàng lá thối rữa tiếp tục gây hại trên các vùng trồng cam chuyên canh đã nhiễm bệnh, bệnh vàng lá thối rữa.gây hại rải rác
Sầu riêng	Chăm sóc sau thu hoạch, phát triển thân lá	Điều kiện thời tiết tuần này và tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn này, việc xử lý nấm và sâu bệnh hại sau khi thu hoạch cực kỳ quan trọng. Nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của sầu riêng. Bên cạnh đó, những vết thương do quá trình thu hoạch trái cũng mở đường cho nấm khuẩn tấn công mạnh mẽ. Một số bệnh thường xuất hiện trên cây sầu riêng giai đoạn này như: Bệnh nứt thân xì mũ do <i>Phytophthora</i> sp., bệnh thán thư,...tiếp tục gây hại sầu riêng giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch.
Điều	Ra lộc, Ra hoa, quả non	Điều là giống cây trồng ở vùng nhiệt đới, bởi thế điều mẫn cảm với nhiệt độ thấp cũng như sương giá. Nhiệt độ để cây điều sinh trưởng và phát triển sẽ trong khoảng từ 24–28 °C. Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho

<b>Cây trồng</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
		<p>thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0-30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm. Điều kiện thời tiết tuần này thuận lợi cho Điều phát triển. Thời kỳ này Điều đang phát triển lộc và ra hoa, cần chú ý phát quang các cỏ bụi, cắt bỏ cành bị sâu bệnh, cành dưới tán không hiệu quả... Tàn dư thực vật (lá khô, cành khô, cỏ dại) có thể đốt hun khói vừa xua đuổi bọ xít muỗi, vừa giúp cây tăng ra hoa. Vườn bị thiệt hại trong vụ trước cần tích cực thực hiện sớm để hạn chế mầm bệnh và nơi trú ẩn của bọ xít muỗi.</p> <p>Cần lưu ý bệnh thán thư, bọ đục chồi, bọ xít muỗi,... gây hại tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương.</p>
Sắn	Phát triển thân lá, phát triển củ, thu hoạch	<p>Điều kiện thời tiết tuần này phù hợp cho sắn phát triển. Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan và gây hại tại các vùng trồng sắn trong cả nước, nhất là khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, trên những diện tích đã nhiễm bệnh và tàn dư sau thu hoạch chưa được xử lý triệt để tại các tỉnh trong vùng. Ngoài ra, cần lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại khác như: bọ phấn trắng, rệp sáp,... Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0-30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm. Điều kiện thời tiết tuần này thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây.</p>
Cây rau màu	Các giai đoạn khác nhau	<p>Nam Bộ đang bước vào mùa khô, rau màu cần được bổ sung nước đầy đủ; lưu ý các loại Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, rệp hại tăng; sâu khoang, bệnh sương mai tiếp tục hại trên cây rau thập tự. Bệnh héo rũ gốc mốc trắng; bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại tăng trên cây khoai tây; bệnh sương mai tiếp tục hại tăng trên cây cà chua; sâu xanh da láng hại hành, rệp, bệnh đốm lá, ... tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến nhẹ - trung bình.</p>
Cây ngô	Cây con, phát triển thân lá, trở cò, thu hoạch	<p>Trong giai đoạn cây con, phát triển thân lá lượng nước cần ổn định để cây phát triển, cần để phòng bệnh khô vằn, sâu keo. Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0-30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm, thời tiết thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây, cần lưu ý tưới nước và giữ ẩm cho ngô trong giai đoạn xoáy nõn đến khi ngô trở cò phun râu xong. Các loại sâu</p>

<b>Cây trồng</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
		bệnh hại thường gặp trên ngô là: Sâu keo mùa thu, sâu đục bắp, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột... tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ... cần thăm đồng thường xuyên và phòng trừ kịp thời, đồng thời xử lý tốt cỏ dại trên ruộng ngô
Cây chôm chôm	Chăm sóc, phát triển thân lá	Điều kiện khí tượng tuần qua tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Thời kỳ này cần tỉa cành, bón phân và chăm sóc cho cây phục hồi. Trong giai đoạn này của cây chôm chôm cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, rệp sáp ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ...
Mía	Đẻ nhánh, vươn lóng, tích lũy đường	Điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Cần lưu ý một số sâu bệnh cho mía: sâu đục thân, bông lá và làm cỏ.
Cây cao su	Khai thác mủ	Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0-30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm. Thời kỳ cuối mùa mưa này, cần bón phân lần 2 cho cây để tăng sản lượng mủ. Đề phòng một số bệnh chính trên cây cao su là: bệnh phấn trắng, xì miệng, bệnh nấm hồng, bệnh khô miệng cạo ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, ...
Mít	Phát triển thân lá, nuôi quả, thu hoạch	Cây mít trong giai đoạn nuôi quả cần bón phân để cây phát triển quả. Trong giai đoạn này của cây mít cần lưu ý các loại sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, sâu đục trái, rệp sáp ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang.
Hồ tiêu	Nuôi quả	Trong giai này cần thường xuyên theo dõi sâu bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời cắt bỏ các bộ phận cây bị bệnh, lưu ý đề phòng các loại bệnh héo chết nhanh, bệnh vàng lá thối rễ tơ, rệp sáp cành, gốc, tuyến trùng rễ tiếp tục gây hại hồ tiêu tại các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Bình Dương và Đông Nam Bộ. Cần bổ sung nước đầy đủ để hồ tiêu phát triển và nuôi quả.

<b>Cây trồng</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
Cây cà phê	Thu hoạch, chăm sóc	Cà phê Chè đã thu hoạch xong, đang trong giai đoạn chăm sóc, ra hoa; cà phê Vối đang giai đoạn thu hoạch. Điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối thích hợp với sự phát triển của cây. Đối với vườn cà phê đã thu hoạch, cần cắt tỉa cành, làm cỏ, bón phân để cây phục hồi và ra hoa; đối với vườn thu hoạch, người dân cần tranh thủ thu hoạch cà phê trong những ngày nắng ráo Trong giai đoạn này của cây cà phê cần lưu ý rệp, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt hại trên cây cà phê
Dừa	Đang trong các giai đoạn	Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần tưới nước bón phân để cây phát triển ổn định. Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0-30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 107.6mm. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của cây. Đề phòng bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu đầu đen có khả năng gia tăng diện tích nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn trong việc chăm sóc cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống.
Cây thanh long	Nuôi quả - thu hoạch	Trong giai đoạn này của cây thanh long cần lưu ý bệnh đốm nâu phân bố tập trung tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời tiết tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Người dân nên chú ý đến tình trạng của cành thường xuyên để kịp thời xử lý từ khi có các dấu hiệu ban đầu, tránh để cây trồng bị ảnh hưởng quá nhiều.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.0 - 32.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5-27.5, tổng lượng mưa là 5-15mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**