



Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 24.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 232.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 137.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 57.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 197.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/12, có mưa, mưa rào rải rác; riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 13-15/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 16-20/12, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 21/12, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.7	25.2	26.9	95.1
Trong tuần	28.9	24.4	26.6	232.4
Tuần tới	28.0 - 31.0	20.0 - 23.0	28.0 - 31.0	20.0 – 50.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 1 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Lúa mùa trà chính vụ	Trỗ - chín - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 24.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 232.4mm, diện tích lúa Mùa trà chín vụ đang ở giai đoạn trỗ - chín - thu hoạch, lúa Đông Xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh, trong tuần đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, do đó, người dân cần tranh thủ những ngày nắng ráo khẩn trương thu hoạch lúa ở những ruộng đã đến giai đoạn thu hoạch. Ngoài ra một số sâu bệnh gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn.
	Lúa Đông Xuân trà sớm	Mạ - đẻ nhánh	

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Ngô	Vụ mùa 2022	PTTL – trỗ cờ - phun râu	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 232.4mm; có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho ngô phát triển, tuy nhiên lượng mưa trong tuần tương đối lớn, cần lưu ý chủ động thoát nước cho đồng ruộng, đồng thời triển khai các biện pháp thích hợp phòng trừ một số sâu bệnh như bệnh sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn.
	Đông Xuân 2022 - 2023	Cây con	
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 232.4mm, người dân cần chủ động tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra. Lưu ý các đối tượng sinh vật như: bọ phấn trắng, rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ. Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan và gây hại tại các vùng trồng sắn trong khu vực.
	Hè Thu 2022	PTTL – củ non – thu hoạch	
	Mùa 2022	Phát triển thân lá	
	ĐX 2022 - 2023	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy lượng mưa trong tuần tương đối lớn (232.4mm). Tăng cường bấm ngọn trên những cây ăn lá để cây ra các nhánh phụ, giảm chiều cao và tăng bề ngang, nhằm hạn chế chiều cao tránh đổ ngã và cây được nhiều lá hơn. Rau lấy quả thì tia bỏ các lá bị sâu bệnh, lá xấu, các cành, nhánh yếu và nhỏ gần gốc. Điều đó giúp cây thông thoáng hơn, giảm độ ẩm, hạn chế được sự phát triển của sâu bệnh hại. Thường xuyên theo dõi và thăm cây để phát hiện rồi diệt trừ sâu bệnh kịp thời.
Thanh Long		Chăm sóc - thu hoạch	Từ bảng 1 thống kê điều kiện thời tiết trong tuần có nền nhiệt dao động từ 24.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 232.4mm, cho thấy điều kiện tương đối thuận lợi cho thanh long sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên tổng lượng mưa nhiều, độ ẩm cao cũng là điều kiện thuận lợi cho bệnh đốm nâu, bệnh thối rễ tộp cành, bệnh thán thư, ốc,...gây hại trên các vườn thanh long. Chú ý cắt bỏ những cành bị nhiễm bệnh, cạo bỏ những phần thịt lá bị bệnh đem tiêu hủy hạn chế tránh lây lan.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C. Theo thống kê tại bảng 1 nhiệt dao động từ 24.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.6°C, tổng lượng mưa là 232.4mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng, lưu ý thoát nước cho những vườn bị ngập do lượng mưa lớn. Trong tuần bệnh bệnh thán thư tiếp tục hại; xì nứt thân mũ gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy lượng mưa trong tuần tương đối cao, người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, thoát nước kịp thời cho những ruộng trũng bị ngập, đồng thời triển khai phòng trừ hiệu quả một số sâu bệnh gây hại như: bệnh tuyến trùng hại rễ, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết nhanh, chết chậm.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 21.0 – 27.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 20.0 – 23.0°C nhiệt độ không khí trung bình 24.0 – 27.0°C, tổng lượng mưa là 20.0 – 50.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng