



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 11.9 - 17.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.6°C, tổng lượng mưa là 32.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 31.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 9.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 25.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 31/12/2022- 10/01/2023, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng các ngày 04-05/01 trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	18.7	11.0	14.8	1.1
Trong tuần	17.3	11.9	14.6	32.6
Tuần tới	16.0-19.0	10.0-13.0	13.0-16.0	5.0-10.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Chiêm xuân	Xuống giống gieo mạ, 1-3 lá	Tuần 3 tháng 12, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 11.9-17.3°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 32.6mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh, có những ngày xảy ra rét đậm – rét hại và lượng mưa gần như không đáng kể, khiến cho quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn này, cần chú ý bảo đảm đầy đủ ẩm và dinh dưỡng cho cây lúa. Trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời giảm thấp, cần có các biện pháp nhằm giữ ẩm cho cây lúa như: dùng nilong làm khung vòm che chắn cho mạ, dùng tro bếp phủ lên trên luống mạ để giữ ẩm cho cây. Trong giai đoạn này, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng hại rễ ... khi phát hiện mật độ gây hại vượt quá mức cho phép cần nhanh chóng phòng trừ kịp thời.

Cây ngô	Đông	Chín sữa – thu hoạch	Cây ngô trong khu vực Tây Bắc trong tuần này hiện trong giai đoạn chín sữa – thu hoạch. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 11.9-17.3°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 32.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, người dân nên tranh thủ thời tiết để tiến hành thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây sâu vụ sau. Một số đối tượng gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn....
Cây lạc	Đông	Phát triển củ - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lạc củ đã già nên người dân cần tranh thủ thời tiết để tập trung thu hoạch các diện tích lạc củ đã già, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây lạc lây lan sang vụ tiếp theo. Đối với các diện tích củ còn trong giai đoạn phát triển nên tưới bổ sung thêm nước cho cây lạc. Trong tuần, cây lạc chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ ...
Cây cà chua		Ra hoa – phát triển quả - thu hoạch	Trong giai đoạn ra hoa – đậu quả, cây cà chua cần rất nhiều nước. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 14.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 32.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho cây cà chua sinh trưởng gây kéo dài thời gian thu hoạch cũng như sụt giảm năng suất và chất lượng quả cà chua thành phẩm. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý: chủ động tưới thêm nước để bảo đảm đủ ẩm cho cây cà chua, tỉa bớt cành lá và quả để giảm bớt gánh nặng nuôi quả cũng như hạn chế sâu bệnh trú ngụ trên cây. Trong tuần, cây cà chua chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: bệnh héo xanh, bệnh đốm lá, bệnh đốm quả, bọ phấn trắng ...
Cây sắn		Phát triển củ	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có lượng

		- thu hoạch	mưa đạt 32.6mm. Từ nhiều tuần nay, khu vực Tây Bắc liên tục có lượng mưa không đáng kể giúp cho việc thu hoạch các diện tích sản củ đã đạt thành phẩm diễn ra thuận lợi. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích sản củ đã già. Sau thu hoạch, nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh lại ruộng đất nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây sản lây lan sang vụ tiếp theo. Bệnh khảm lá sản do virus, sùng trắng, rệp sáp bột hồng ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sản trong tuần cần chú ý.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả chín – thu hoạch	Cây ăn quả có múi trong khu vực Tây Bắc trong tuần tiếp tục trong giai đoạn quả chín – thu hoạch. Điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Tuy nhiên, cũng do thời tiết khô hanh và nhiệt độ thấp khiến cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển kém nên trong quá trình chăm sóc cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục quả, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo, rám quả ...
Cây nhãn		Phát triển lộc	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 11.9-17.3°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 32.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tiếp tục thuận lợi cho việc kích thích sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn. Trong quá trình chăm sóc, cần thường xuyên kiểm tra vườn nhãn để kịp thời phát hiện những mầm đông mọc sớm để kịp thời có các biện pháp xử lý phù hợp. Trong giai đoạn phát triển lộc, cần lưu ý các đối tượng: bọ xít, bệnh khô cành, bệnh thán thư, bệnh chổi rồng ... phát sinh gây hại trên cây nhãn.
Cây chè		Đón cành	Tuần 3 tháng 12, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 14.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 32.6mm. Trong tuần, cây chè tiếp tục trong giai đoạn đón cành, cần căn cứ vào sinh trưởng của cây chè để lựa chọn phương pháp đón chè phù hợp cho từng diện tích chè. Cần đón chè trong những ngày thời tiết nắng nhẹ, có mưa nhỏ để tránh tình trạng

			khô đầu cành khi đốn. Trong giai đoạn đốn, một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè: sâu đục thân, bọ xít
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0-19.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.0-16.0°C, tổng lượng mưa là 5.0-10.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa dự báo không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tiếp tục dọn dẹp vệ sinh lại ruộng đất để tiến hành gieo trồng vụ Đông xuân 2022-2023; Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp, riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Tiếp tục bón phân hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng theo từng giai đoạn sinh trưởng; Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng trong điều kiện thời tiết lạnh và rét; Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ hợp lý.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng