



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 9.6 – 16.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.8°C, tổng lượng mưa là 6.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 12.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 2.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-27/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 28-31/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng đêm 28 và ngày 29/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.7	13.8	15.7	19.5
Trong tuần	16.0	9.6	12.8	6.9
Tuần tới	21.0-24.0	12.0-15.0	16.5-19.5	15.0-25.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	Phát triển bắp – thâm râu – thu hoạch	Trong giai đoạn phát triển bắp – thâm râu, nước và dinh dưỡng đầy đủ là yếu tố rất quan trọng. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 9.6-16.0°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 6.9mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh và gần như không có mưa, việc thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm diễn ra thuận lợi, tuy nhiên cũng do điều kiện thời tiết trong tuần khô hanh nên cây ngô sinh trưởng và phát triển kém khiến cho quá trình tích lũy vật chất vào trong bắp ngô bị ảnh hưởng khiến cho năng suất và chất lượng bắp ngô thành phẩm bị giảm sút. Do đó, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô đồng thời trong quá trình tưới, cần kết hợp bón thêm phân (chú trọng phân lân và kali để giúp cây tăng cường khả năng chống chịu trước điều

			<p>kiện thời tiết lạnh và rét) bổ sung để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Trong tuần, cây ngô chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng cần chú ý: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp hại, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn ...</p>
Cây lạc	Đông	Phát triển củ - chắc củ	<p>Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 12.8°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 6.9mm. Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết hanh khô và nhiệt độ thấp, cây lạc sinh trưởng và phát triển chậm khiến cho quá trình phát triển củ và tích lũy chất khô vào củ bị ảnh hưởng gây sụt giảm năng suất cũng như kéo dài thời gian để cho thu hoạch củ lạc thành phẩm. Sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, gỉ sắt ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động phòng trừ kịp thời, ngoài ra, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.</p>
Cây đậu tương		Tạo quả - chắc quả	<p>Cây đậu tương sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 21.0-34.0°C, riêng thời kỳ làm quả thì nhiệt độ thích hợp cho cây đậu tương từ 21.0-23.0°C; đồng thời trong giai đoạn này, cây đậu tương yêu cầu đầy đủ độ ẩm. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 9.6-16.0°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 6.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực lạnh và mưa không đáng kể không thuận lợi cho sinh trưởng của cây đậu tương nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây đậu tương. Trong giai đoạn tạo quả - chắc quả, một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính trên cây đậu tương cần chú ý: sâu đục quả, bọ xít xanh, bệnh lở cổ rễ.</p>
Cây sắn		Thu hoạch	<p>Trong tuần này, thời tiết của khu vực Việt Bắc chủ đạo là lạnh và khô, đây là điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch các diện tích sắn củ đã có thể cho thu hoạch. Sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp lại đồng ruộng, tiến hành thu gom và tiêu hủy</p>

			toàn bộ phế phẩm còn lại của cây sắn cũng như cỏ cũ còn lại trong ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây sắn.
Cây ăn quả có múi	Cam, quýt	Quả già, chín - thu hoạch	Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc trong tuần tiếp tục giảm so với tuần trước, với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 2.9°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này không đáng kể. Trong điều kiện thời tiết như trên, việc thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín diễn ra thuận lợi nên người dân cần tranh thủ thời tiết để tập trung thu hoạch các diện tích quả đã chín nhằm bảo đảm chất lượng của quả có múi thành phẩm. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết lạnh và khô cây ăn quả có múi sinh trưởng kém nên cần chú ý: tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm đầy đủ độ ẩm, sử dụng rơm rạ, cỏ khô, nilong để tủ xung quanh gốc nhằm giữ ẩm cho cây. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng gây hại chủ yếu: sâu đục quả, ngài trích hút, nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo, bệnh vàng lá thối rễ ...
	Bưởi	Quả chín – thu hoạch	
Cây vải		Phát triển lộc	Theo số liệu thông kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 12.8°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 6.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực Việt Bắc trong tuần tiếp tục thuận lợi để giúp cây vải kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây vải. Trong giai đoạn này, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn vải kịp thời phát hiện những mầm đông mọc sớm để tiến hành ngắt bỏ kịp thời, ngoài ra, cần chú ý các đối tượng: bọ xít, nhện lông nhung, bệnh thán thư, bệnh sương mai khả năng phát sinh gây hại mạnh trên cây vải.
Cây chè		Đốn cành	Các diện tích chè trong khu vực Việt Bắc hiện đã chuyển sang giai đoạn đốn. Trong tuần này, thời tiết của khu vực chủ đạo là khô hanh và nhiệt độ thấp. Trong điều kiện thời tiết như trên, công tác dọn dẹp vệ sinh và đốn chè diễn ra thuận lợi. Trong giai đoạn đốn, tùy thuộc vào từng diện tích chè mà lựa chọn phương pháp đốn chè phù hợp, cần đốn khi trời râm mát hoặc có mưa nhỏ là tốt nhất, không đốn khi tiết trời nắng hanh sẽ làm cho chè bị khô đầu cành. Sau đốn, cần thu dọn hết cành,

			nhánh chè sau khi đốn xong đưa ra ngoài bờ lô để ép xanh kết hợp cùng với các loại cây phân xanh và vôi nhằm tạo thêm nguồn phân hữu cơ để bón cho chè sau này; xới xáo, làm cỏ rồi bón phân hữu cơ và phân lân, đồng thời phun 1 lượt thuốc trừ sâu sinh học nhằm tiêu diệt và hạn chế sâu bệnh gây hại. Trong điều kiện thời tiết giá rét, nên dùng rơm, rạ, cỏ khô ... để phủ kín giữa các hàng chè sau vừa để giữ ẩm cho đất, chống hạn cho cây, giữ ẩm chống lạnh cho cây chè qua đông, đồng thời hạn chế cỏ dại.
--	--	--	--

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 12.0-24.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.5-19.5°C, tổng lượng mưa là 15.0-25.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa dự báo tuần tới của khu vực không đáng kể. Do đó, trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tiến hành cày bừa, dọn dẹp vệ sinh lại ruộng đất để chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2022-2023; Chủ động nguồn nước để tiếp tục tưới bổ sung cho các loại cây trồng (ngô, lạc, đậu tương, cây ăn quả có múi...) trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng, riêng đối với cây vải cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông; Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng