



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 15.2 - 21.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 26.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 8.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-16/02, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 13/02 sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, riêng ngày 16/02 đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 17-20/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 19-20/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.5	17.0	20.3	23.2
Trong tuần	21.0	15.2	18.1	26.9
Tuần tới	22.0-25.0	13.0-16.0	17.5-20.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Xuân sớm	Đẻ nhánh	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này nhiệt độ dao động từ $15.2 - 21.0^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C , tổng lượng mưa là 26.9mm, tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh virus lúa, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Mía		Tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là $20-25^{\circ}\text{C}$, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ $15.2 - 21.0^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C , tổng lượng mưa là 26.9mm; cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			nư bón phân cân đối, không bón quá nhiều đạm.
Thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu trong tuần cho thấy điều kiện khí tượng như sau: nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.2 - 21.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 26.9mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu đục ngọn, bọ hung nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Sắn	Xuân	Cây con	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 15.2 - 21.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 26.9mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Ngô	Xuân	Cây con	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là độ 25-28 độ C, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động từ 15.2 - 21.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 26.9mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép và đúng liều lượng.
Cây ăn quả		Chín - sau thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 15.2 - 21.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 26.9mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp trừ sâu và bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phân hoá mầm hoa	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 13.0-16.0 độ C và lượng mưa dao động trong khoảng 20.0-40.0mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh nấm hồng, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng ngay các biện pháp xử lý hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 13.0-16.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.5-20.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ thấp với nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 13.0-16.0°C, do đó, cây trồng cần có biện pháp chống rét hiệu quả như: đảm bảo chế độ tưới nước thích hợp, nếu sương muối kéo dài thì che phủ bạt nilon hoặc phủ gốc bằng trấu để giữ ấm cho rau đồng thời áp dụng các biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng