



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 2 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 12.5 - 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C, tổng lượng mưa là 82.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 4.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 52mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 17.1\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 72.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/02, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm 21 và ngày 22/02 có mưa rải rác. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; từ ngày 27/02 sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét; riêng 24/02, trời rét đậm. Từ ngày 01-03/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.3	11.9	16.1	30.7
Trong tuần	19.3	12.5	15.9	82.7
Tuần tới	26.0-29.0	8.0-11.0	17.0-20.0	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Mạ chiêm xuân sớm (3 lá - nhỏ cây) Lúa cấy (Gieo - để nhánh) Lúa sạ (Sạ - hồi xanh - để nhánh)	Trong tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm so với tuần trước (mức chênh lệch $0.2^{\circ}\text{C}$ ), lượng mưa trong tuần này đạt 82.7mm (tăng 52.0mm so với tuần trước), mưa tập trung chủ yếu vào nửa sau của tuần. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây lúa sinh trưởng kém. Do đó, người dân cần chú ý các biện pháp giúp giữ ấm cho cây lúa, điều tiết nước kết hợp bón phân giúp cho cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết, đặc biệt lưu ý không tiến hành gieo cấy khi nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới $15^{\circ}\text{C}$ . Trong tuần, cây lúa chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh hại: sâu đục thân cú mèo, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, chuột...

Cây ngô	Xuân 2022	Gieo trồng – 3 lá	Tuần 2 tháng 2, cây ngô Xuân trong khu vực Tây Bắc đang trong các giai đoạn mới gieo trồng – 3 lá. Trong giai đoạn này, cây ngô yêu cầu điều kiện ngoại cảnh chủ yếu: nước, nhiệt độ, không khí để bảo đảm cho hạt ngô nảy mầm cũng như cây ngô con phát triển bộ rễ thuận lợi. Yêu cầu nhiệt độ lúc này từ 25-30°C, độ ẩm đất thích hợp từ 60-70%, đất tơi xốp và thông thoáng khí. Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 12.5-19.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 82.7mm. Có thể nhận thấy, thời tiết trong tuần của khu vực không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý bốn thúc giúp cho cây ngô sinh trưởng tốt cũng như tăng khả năng chống chịu với thời tiết. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: sâu xám, bệnh chết héo cây con...
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – 3 lá	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực tương đối thấp. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 95.7mm, tập chung chủ yếu vào nửa cuối tuần khiến cho nửa đầu tuần thời tiết khu vực chủ đạo là lạnh và khô gây ảnh hưởng đến quá trình mọc mầm ở cây lạc. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: bệnh héo cây con, sâu xám, sâu khoang...
Cây ăn quả có múi (cam, bưởi)		Thu hoạch – phát triển lộc, hoa	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 15.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 82.7mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này của khu vực khá phù hợp cho cây ăn quả có múi phát triển lộc. Trong quá trình chăm sóc cần lưu ý: tiếp tục thu hoạch nốt các diện tích quả còn sót lại đồng thời tiến hành chăm sóc để cây ra lộc đúng thời điểm bảo đảm cho vụ tiếp theo. Sâu đục thân/cành, bệnh vàng lá thối rễ... là một số đối tượng sâu bệnh hại cây ăn quả có múi trong tuần.
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Tuần 2 tháng 2, cây vải trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc, một số diện tích vải đã bắt đầu phát hoa. Nhiệt độ thích hợp cho cây vải ra hoa từ 18-24°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 12.5-19.3°C.

			Trong điều kiện thời tiết lạnh, việc ra hoa ở cây vải bị chậm. Cần chú ý, trong giai đoạn này khi chiều dài của hoa đạt từ 4 - 6 cm có thể khoan nhẹ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoa, hạn chế hiện tượng ra hoa kẹp lộc; kết hợp tia cành tăm, cành sâu bệnh, cành trong tán... tạo điều kiện cho cành chính phát triển, đồng thời giúp giảm sự trú ngụ của sâu bệnh và tạo điều kiện cho việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh sau này thuận tiện hơn. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải trong tuần: bọ xít nâu, nhện lông nhung...
Cây chè		Đốn – chăm sóc – phát triển búp	Cây chè trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn đốn – chăm sóc, một số diện tích chè đã chuyển sang giai đoạn phát triển búp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ của khu vực tương đối thấp khiến cho cây chè sinh trưởng chậm (ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển búp ở cây chè). Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý: tiếp tục công tác đốn thân, tia cành, dọn dẹp vệ sinh lại nương chè; phun thuốc tiêu trừ mầm bệnh còn sót lại trên cây chè kết hợp với tưới nước và bón phân để giúp cây chè nhanh chóng phục hồi và phát triển búp. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè trong tuần cần chú ý: sâu đục thân, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 8.0 – 29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.0-20.0°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm. Do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Các cây trồng cần được chú ý: bảo đảm điều tiết nước hợp lý, bón phân đầy đủ và cân đối, chủ động các biện pháp phòng chống rét cũng như sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Riêng đối với cây lúa: không gieo cấy khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C (cần đợi khi thời tiết ấm lại mới gieo cấy); đối với các diện tích lúa đã cấy khi thời tiết nắng ấm, cần tiến hành tia dặm kết hợp bón thúc để cây lúa sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh; chú ý bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa theo từng giai đoạn; theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá để kịp thời có các biện pháp phòng chống phù hợp.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng