



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 2 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 19.5 - 27.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 35.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 11.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 28.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21/02-03/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.5	17.3	22.4	38.8
Trong tuần	27.8	19.5	23.7	35.7
Tuần tới	30.0-33.0	17.0-20.0	23.5-26.5	5.0-10.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 2 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa Đông Xuân 2021 - 2022	Trà sớm	Làm đòng – trổ	Giai đoạn mạ - đẻ nhánh - làm đòng nhiệt độ thích hợp để phát triển là 25 – 32°C. Giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Từ bảng thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7 mm chưa phải là điều kiện thuận lợi nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần bọ trĩ, ruồi đục nõn, ốc bươu vàng tiếp tục gây hại phổ biến nhẹ - trung bình trên lúa Đông Xuân muộn. Chuột tiếp tục gây hại mạnh trên lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ, gây hại phổ biến nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
	Trà chính vụ	Đẻ nhánh - đứng cái	
	Trà muộn	Mạ - đẻ nhánh	

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Ngô	Đông xuân 2021-2022	Cây con – PTTL – trở cò	Trong giai đoạn cây con, PTTL nhiệt độ thích hợp từ 25-28°C. Thời kỳ phun râu nhiệt độ thích hợp từ 23 - 28°C. Theo thống kê nhiệt độ dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7 mm, cho thấy nhiệt độ thấp hơn ngưỡng tốt nhất cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô. Trong tuần sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT.
Sắn	ĐX 2020 - 2021	Thu hoạch xong	Thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Thống kê từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7mm là điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn . Trong tuần bệnh khảm lá virus gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT, bệnh phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Kom Tum.
	Hè Thu 2021	Tích lũy tinh bột - TH	
	Vụ Mùa 2021	PTTL - tạo củ	
	ĐX 2021-2022	Mọc mầm – cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, bệnh sung rỗ, bệnh thối nhũn gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự; ruồi đục lá, bệnh mốc sương, xoắn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên rau họ cà.
Sầu riêng		Chăm sóc – ra hoa	Nhiệt độ thích hợp cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển dao động từ 24 – 35°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt độ dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7 mm, cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát. Bệnh xì mủ phát sinh gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT.
Cà phê		Chăm sóc	Nhiệt độ thích hợp đối với cà phê chè từ 18–25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C. Theo thống kê trong tuần nhiệt dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7mm, là điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển. Bệnh gỉ sắt có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bố tập trung tại Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh khô cành

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố tập trung tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.
Hồ tiêu		Chắc quả - chín bói	Nhiệt độ thích hợp cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê nhiệt độ dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7mm, là điều kiện thích hợp nhất cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu. Trong tuần tuyến trùng gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; bệnh chết nhanh diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh chết chậm có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
Điều		Ra hoa – đậu quả	Nhiệt độ thích hợp để cây điều sinh trưởng và phát triển tốt là 24 đến 28°C, lượng nước cần từ 28 – 50mm/tuần. Từ thống kê tại bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 19.5 đến 27.8°C, nhiệt độ trung bình 23.7°C và tổng lượng mưa là 35.7mm, cho thấy điều kiện thời tiết không phải thuận lợi nhất cho các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây điều trong tuần này. Trong tuần bọ xít muỗi có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT, phân bố tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai; bệnh thán thư có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo tối cao dao động từ 30-33°C, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20°C, nhiệt độ trung bình trong khoảng 23.5-26.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5-10mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng