



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 17.9 - 23.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.6°C, tổng lượng mưa là 25.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét rét hại; phía Nam trời rét đậm. Từ ngày 23-28/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét; riêng ngày 23/02 phía Bắc trời rét đậm. Từ ngày 01-03/03, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.4	19.2	20.8	27.4
Trong tuần	23.3	17.9	20.6	25.2
Tuần tới	26.0-29.0	15.0-18.0	20.5-23.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Cây – bén rễ, hồi xanh - đẻ nhánh - đứng cái - trổ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực có xu thế giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, nhiệt độ trung bình tuần này đạt 20.6°C, giảm 0.2°C so với tuần trước; lượng mưa tuần này đạt 25.2mm, giảm 2.2mm so với tuần trước. Cây lúa hiện đang sinh trưởng và phát triển bình thường, tuy nhiên với lượng mưa từ nhiều tuần nay của khu vực tương đối thấp, người dân cần chủ động tưới thêm nước kết hợp với bón thúc và làm cỏ sục bùn để giúp cho cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần: bệnh đạo ôn lá, ốc bươu vàng, chuột...

Cây ngô	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá - trổ cờ	<p>Trong các giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô sinh trưởng từ 20-30°C. Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 17.9-23.3°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 25.2mm. Có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây ngô nhất là các diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ. Do đó, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô, ngoài ra cần kết hợp bón thêm phân bổ sung trong các đợt tưới nước. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô cần chú ý: sâu xám, sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh khô vằn...</p>
Cây lạc	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá – ra hoa	<p>Tuần 2 tháng 2, nhiệt độ trung bình của khu vực Trung Trung Bộ đạt 20.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 25.2mm. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây lạc: nhiệt độ cao, đầy đủ ẩm và dinh dưỡng. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc từ 23-33°C. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần thấp ảnh hưởng không tốt tới sinh trưởng của cây lạc (đặc biệt là quá trình ra hoa ở cây lạc, nhiệt độ thấp khiến số lượng hoa giảm sút đáng kể). Các đối tượng sâu bệnh gây hại cây lạc trong tuần cần chú ý: sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh vi khuẩn... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chủ động bổ sung thêm nước cho cây lạc trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.</p>
Cây sắn	Niên vụ 2021	Phát triển củ - thu hoạch	<p>Trong tuần này, cây sắn niên vụ 2021 trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Có thể nhận thấy thời tiết trong tuần này của khu vực khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Tuy nhiên, đối với các diện tích sắn còn lại, để bảo đảm cho cây sắn sinh trưởng tốt, người dân cần tưới bổ sung nước cho cây sắn trong điều kiện lượng mưa của khu vực từ nhiều tuần nay tương đối thấp. Trong tuần, cây sắn chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, rệp sáp...</p>
	Đông Xuân 2021-2022	Mọc mầm – cây con	

Cây ăn quả có múi		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục thu hoạch nốt các diện tích quả còn lại. Sau thu hoạch, cần nhanh chóng vệ sinh lại vườn cây, tĩa cành, chăm sóc, bón phân để giúp cây ăn quả có múi nhanh chóng phục hồi sau khi thu hoạch quả. Ngoài ra, sau khi vệ sinh lại vườn cây, người dân cần phun thuốc để giúp tiêu trừ mầm bệnh còn khu trú trên cây để hạn chế sâu bệnh gây hại lây lan sang vụ tiếp theo.
Cây cao su		Chăm sóc, thay lá	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 17.9-23.3°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 25.2mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây cao su sinh trưởng chậm. Bệnh rụng lá, loét sọc miệng cao...tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cao su trong tuần. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại để kịp thời phòng trừ, ngoài ra cần tưới thêm nước bổ sung kết hợp bón phân cho cây cao su để bảo đảm cây cao su sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh hại.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.0 – 29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5-23.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần này. Một số lưu ý đối với các loại cây trồng trong tuần tới: Bảo đảm cung cấp đủ nước, phân bón, chủ động theo dõi và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại. Riêng đối với cây lúa: cần tiếp tục chăm sóc, tĩa dặm kết hợp bón phân và điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn để giúp cây lúa sinh trưởng tốt tăng khả năng chống chịu với sinh vật gây hại; Theo dõi diễn biến thời tiết và các đối tượng sinh vật gây hại (nhất là bệnh đạo ôn lá) để có biện pháp chăm sóc, chống rét và phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả. Đối với cây ăn quả có múi: tiếp tục vệ sinh vườn, cắt tỉa các cành vượt, sâu bệnh, chống đỡ các cành gần mặt đất, vun gốc, chống đổ ngã, thoát nước cho vườn khi mưa to, gió lớn; Tăng cường chăm sóc, bón phân cân đối giúp cây sinh trưởng phát triển khỏe, chống chịu sâu bệnh hại. Đối với cây sắn: tranh thủ thời tiết tạnh ráo tiến hành làm đất trồng sắn đảm bảo khung lịch thời vụ năm 2022, không sử dụng hom sắn đã nhiễm bệnh khảm lá sắn để trồng.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng