



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 8.4 - 14.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.3°C, tổng lượng mưa là 15.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 80.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 5.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 14.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 01-02/3, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 02-06/3 và từ ngày 08-11/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 06-07/03, có mưa rào và rải rác có dông. Trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	15.1	10.8	12.9	95.7
Trong tuần	14.3	8.4	11.3	15.4
Tuần tới	22.0-25.0	16.0-19.0	19.0-22.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Lúa cấy (cây - hồi xanh - đẻ nhánh) Lúa sạ (hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ)	Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong tuần khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ giảm sâu. Với mức nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 8.4-14.3°C, thời tiết rét đậm – rét hại gây ảnh hưởng rất xấu đến sinh trưởng của cây lúa (nhiều diện tích lúa đã bị chết do quá rét). Ngoài ra, trong tuần khu vực Việt Bắc có mưa rất thấp với lượng mưa chỉ đạt 15.4mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, để hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra, người dân cần chú ý một số vấn đề: luôn bảo đảm duy trì mực nước trong ruộng khoảng 3cm để bảo đảm giữ ấm chân cho cây lúa; bón thêm tro bếp, phân Lân và Kali để giúp giữ ấm cho cây lúa và tăng sức chống chịu với thời tiết cho cây; chú ý tía dặm để bảo đảm mật độ gieo trồng; ngoài ra cần chú ý theo dõi diễn

			biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa để kịp thời phòng trừ hiệu quả.
Cây ngô	Xuân 2022	Gieo trồng – 7 lá	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình đạt 11.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 15.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần rất bất lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Trong thời điểm này, tuyệt đối không tiến hành gieo trồng ngô để hạn chế tối đa thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra (các diện tích ngô đã đến thời vụ gieo trồng cần chờ khi thời tiết ấm lại mới tiến hành gieo trồng). Đối với các diện tích đã trồng cần chú ý: dùng rơm rạ phủ quanh gốc để giữ ẩm cho cây, bón bổ sung phân để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết, chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ngô để bảo đảm nhu cầu về nước của cây, theo dõi và chủ động phòng trừ các đối tượng gây hại trên cây ngô: bệnh vàng lá, bệnh thối thân, sâu keo mùa thu, sâu xám...
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – 4 lá - phân cành	Tuần 3 tháng 2, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ giảm (trung bình 1.6°C so với tuần trước, tuần trước nhiệt độ không khí trung bình của khu vực đạt 12.9°C); lượng mưa trong tuần này của khu vực giảm mạnh so (lượng mưa tuần này đạt 15.4mm, giảm 80.3mm so với tuần trước). Trong điều kiện thời tiết như trên, cây lạc sinh trưởng rất chậm (thậm chí có những diện tích lạc bị chết do rét đậm rét hại gây ra). Để giúp hạn chế tối đa tác động của thời tiết lên cây trồng, người dân cần chú ý: bảo đảm giữ ẩm cho cây lạc (dùng rơm rạ để phủ lên trên luống lạc), chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng (những ngày trời rét hại nên tưới nước buổi sáng để giúp tan sương, tránh sương giá làm héo úa cây lạc)... Do thời tiết lạnh, các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần không đáng kể.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển lộc – ra hoa	Trong tuần này, cây ăn quả có múi trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc – ra hoa. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực là điều kiện không phù hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung kết hợp bón phân giúp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả

			năng chống chịu với thời tiết và sâu bệnh hại. Một số đối tượng phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, sâu vẽ bùa, rệp sáp...
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Tuần 3 tháng 2, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ rất thấp (nhiệt độ không khí thấp nhất đạt 8.4°C) do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta. Nền nhiệt độ thấp kèm theo lượng mưa không đáng kể (15.4mm) là điều kiện bất lợi cho sinh trưởng của cây vải trong giai đoạn này. Trong thời kỳ cây vải ra hoa, đối tượng bọ xít nâu, sâu đục nụ hoa là đối tượng phát sinh gây hại chủ yếu và nặng nề trên các chùm hoa vải. Người dân cần đặc biệt lưu ý để kịp thời phòng trừ, tránh cho các đối tượng này chích hút gây ảnh hưởng đến các chùm hoa. Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây vải.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Cây chè trong khu vực Việt Bắc hiện đang trong các giai đoạn chăm sóc - phát triển búp – thu hái. Điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực rét đậm, rét hại và lượng mưa không đáng kể khiến cho cây chè sinh trưởng rất chậm, ảnh hưởng lớn tới tốc độ phát triển của búp chè (khiến năng suất chè thu hoạch được bị sụt giảm). Sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây chè trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.0-25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0-22.0°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa không đáng kể. Trong tuần tới, các cây trồng cần được chú ý: tranh thủ thời tiết ấm hơn, người dân cần tích cực chăm sóc giúp cây trồng nhanh chóng phục hồi sau thời gian rét đậm rét hại; chủ động nguồn nước để phân bổ cho từng loại cây trồng theo nhu cầu, bảo đảm cây trồng không bị thiếu nước; kết hợp bón phân để thúc cho cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết cũng như các đối tượng gây hại; ngoài ra cần theo dõi chặt chẽ biến biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng