



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 3 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 20.4 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 40.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 39.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 10.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 25.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 01/4 và 02/4 khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, sau suy yếu dần và lệch ra phía Đông, sau có khả năng bổ sung yếu vào đêm ngày 05/4. Khu vực có mưa rào và rải rác có dông trong ngày đầu, sau có mưa vài nơi, ngày hứng nắng, trời rét; từ ngày 05/4, trời rét về đêm và sáng. Tổng lượng mưa phổ biến khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.7	21.4	23.6	1.2
Trong tuần	26.3	20.4	23.3	40.4
Tuần tới	27.0-30.0	14.0-17.0	20.5-23.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Đẻ nhánh rõ - cuối đẻ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 20.4 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 40.4mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là độ 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ tuần 3 tháng 3 phù hợp cho lúa phát triển tuy nhiên trong tuần có tổng lượng mưa thấp nên người dân cần chủ động cung cấp đủ nước cho ruộng lúa đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh thối đen lép lửng, sâu phao; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây ăn quả		Phát triển lộc - hoa, đậu quả	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.5-23.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, nhiệt độ thích

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ 23-29 độ C, có thể nhận thấy tuần tới nhiệt độ phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây tuy nhiên cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Xuân	Xoáy nõn - trổ cờ	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là độ 22.0-28.0 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.4 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 40.4mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần này phù hợp cho ngô phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 20.4 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 40.4mm. Hai thời điểm nhãn có nhu cầu nước nhiều nhất là lúc chùm hoa phát triển (tháng 2 – tháng 3) và giai đoạn quả non (tháng 5 – tháng 6), số liệu khí tượng trong tuần cho thấy lượng mưa tương đối thấp do đó cần tưới bổ sung nước cho nhãn đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây chè		Chăm sóc - phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.4 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 40.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát và ưa ánh sáng tán xạ, giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15.0-28.0°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 3 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè khi bọ trĩ phát triển rộ.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.5-23.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy lượng mưa dự báo tuần kế tiếp thấp, cần đảm bảo tưới bổ sung đủ nước cho rau màu đồng thời lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh, tránh lây lan sang diện tích khác.
Cây lạc xuân	Xuân	Đâm tía	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.4 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.3°C, tổng lượng mưa là 40.4mm, trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, độ ẩm đầy đủ, dinh dưỡng nhiều. Nhiệt độ thích hợp cho ra hoa là từ 23.0-33.0°C, khi nhiệt độ giảm xuống 22.0°C sẽ làm giảm số hoa và hoa nở không đều; có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ trong tuần thích hợp cho lạc phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 14.0-17.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.5-23.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, tuy nhiên lượng mưa dự báo giảm (10.0-20.0mm) do đó cây trồng cần được chủ động tưới đủ nước và có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng