



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 15.5 - 24.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.2°C, tổng lượng mưa là 24.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 6.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 14mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 8.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-13/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 14-17/03, mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18-20/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.0	9.1	13.0	10.7
Trong tuần	24.9	15.5	20.2	24.7
Tuần tới	23.0-26.0	10.0-13.0	16.5-19.5	10.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Lúa cây (cây - hồi xanh - đẻ nhánh) Lúa sạ (đẻ nhánh - đẻ rộ)	Tuần 1 tháng 3, cây lúa trong khu vực Tây Bắc đang trong nhiều giai đoạn cây - đẻ nhánh rộ. Nền nhiệt độ của khu vực trong tháng 3 dao động trong khoảng $15.5-24.9^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 24.7mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực cơ bản không thuận lợi cho cây lúa phát triển. Trong các giai đoạn này, cần chú ý điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, kết hợp bón phân để giúp cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh (đẻ nhánh khỏe và tăng nhánh hữu hiệu). Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa: bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ, bệnh nghệt rễ...

Cây ngô	Xuân 2022	Gieo trồng – 7 lá – xoáy nõn	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 20.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 24.7mm. Trong giai đoạn này, cây ngô có khả năng chịu hạn và chịu rét tốt hơn trong suốt chu kỳ sinh trưởng, yêu cầu về điều kiện nhiệt độ từ 20-30°C (tối thích từ 25-28°C) và độ ẩm trong khoảng 60-70%. Với điều kiện thời tiết trong tuần và nhiều tuần nay mưa tương đối thấp khiến cho cây ngô sinh trưởng chậm. Do đó, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô để bảo đảm nhu cầu của cây ngô. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh vàng lá...
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – 4 lá - phân cành	Cây lạc trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong các giai đoạn cây con – 4 lá – phân cành. Trong tuần, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng đáng kể so với tuần trước, tuy nhiên lượng mưa trong tuần này của khu vực vẫn ở mức thấp là điều kiện không thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh hại: bệnh lở cổ rễ, sâu xám, bệnh đốm lá...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển lộc – ra hoa	Trong tuần này, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 24.7mm, nhiệt độ không khí trung bình đạt 20.2°C. Lượng mưa thấp gây ảnh hưởng xấu tới quá trình phát lộc – ra hoa ở cây ăn quả có múi. Trong quá trình chăm sóc, bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ăn quả có múi trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực có xu thế tăng mạnh (trung bình tăng 7.2°C) so với tuần trước, lượng mưa trong tuần này có tăng tuy nhiên không đáng kể. Việc thiếu nước trong thời kỳ này sẽ gây sụt giảm số lượng hoa, rụng hoa. Do đó, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây nhãn. Ngoài ra, trong thời kỳ này, người dân cần đặc biệt lưu ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn (nhất là đối tượng bọ xít nâu). Khi phát hiện cần khẩn trương phòng trừ.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển	Tuần 1 tháng 3, cây chè trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong các giai đoạn chăm sóc –

		búp – thu hái	phát triển búp – thu hái. Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước là điều kiện tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần và nhiều tuần nay của khu vực tương đối thấp, lượng mưa thấp khiến cho cây chè sinh trưởng chậm (ảnh hưởng tới tốc độ phát triển búp trên cây chè). Để bảo đảm cho cây chè sinh trưởng tốt nhất. Người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây. Bên cạnh đó, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè: sâu đục thân, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ...
--	--	---------------	---

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0 – 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.5-19.5°C, tổng lượng mưa là 10.0-30.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa tương đối thấp. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho từng loại cây trồng, trong quá trình tưới cần kết hợp bón phân bổ sung để giúp cho cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết cũng như sâu bệnh hại; tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại và căn cứ vào mật độ cũng như mức độ gây hại của từng đối tượng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng