



Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 3 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 3 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 18.5 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 84.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 73mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 21.4\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 62.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới (01-10/4/2022): Hai ngày đầu, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của KKL có cường độ mạnh, sau suy yếu dần và lệch ra phía Đông, sau có khả năng bổ sung yếu và đêm ngày 05/4. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông trong ngày đầu, sau có mưa vài nơi, ngày hửng nắng, trời rét; từ ngày 05/4, trời rét về đêm và sáng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

| Đặc trưng  | Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ ) |           |            | Lượng mưa (mm) |
|------------|---|-----------|------------|----------------|
|            | Tối cao                                   | Tối thấp  | Trung bình |                |
| Tuần trước | 28.1                                      | 19.5      | 23.8       | 11.7           |
| Trong tuần | 26.6                                      | 18.5      | 22.5       | 84.7           |
| Tuần tới   | 30.0-33.0                                 | 13.0-16.0 | 21.5-24.5  | 15.0-30.0      |

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

| Cây trồng | Mùa vụ     | Đặc trưng sinh trưởng                          | Khuyến cáo, lưu ý  |
|-----------|------------|--|--|
| Cây lúa   | Chiêm xuân | Hồi xanh - đẻ nhánh - đứng cái - phân hóa đòng | Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng $18.5-26.6^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực đạt 84.7 mm. Có thể nhận thấy, nhiệt độ tuần này của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần ở mức trung bình, do đó, cần chủ động tưới bổ sung cho cây lúa theo nhu cầu của từng giai đoạn (cụ thể: cây lúa trong thời kỳ đẻ nhánh - đứng cái cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5cm, cây lúa trong giai đoạn đứng cái - trở cần áp dụng biện pháp tưới “Ướt - khô xen kẽ”) để bảo đảm cây lúa sinh trưởng khỏe mạnh, đẻ nhánh khỏe và tăng nhánh hữu hiệu; ngoài ra, cần chú ý làm cỏ, bón phân để giúp cây lúa sinh trưởng khỏe |

|               |           |                                     |   |
|---------------|-----------|-------------------------------------|---|
|               |           |                                     | <p> mạnh và tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần: bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá...</p>   |
| Cây ngô       | Xuân 2022 | 3-5 lá – xoáy nõn - trổ cờ          | <p> Cây ngô trong khu vực Tây Bắc hiện đang trong các giai đoạn 3-5 lá - trổ cờ. Trong các giai đoạn này, cây ngô rất cần nước, việc thiếu nước trong các giai đoạn này sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây ngô. Tuần này nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 22.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 84.7mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý bón thúc để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh. Sâu xám, sâu khoang, sâu cuốn lá... là một số đối tượng gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý.</p>   |
| Cây lạc       | Xuân 2022 | 3-5 lá – phân cành – đâm tia        | <p> Tuần 3 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm nhẹ, lượng mưa của khu vực tăng mạnh so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 84.7mm, tăng 73.0mm). Cây lạc hiện đang sinh trưởng tốt, cần chú ý xới xáo giúp đất tơi xốp, tiến hành làm cỏ để tránh cỏ dại hút hết chất dinh dưỡng có trong đất của cây lạc. Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi 1 số đối tượng sâu bệnh hại: sâu xám, sâu khoang, bệnh đốm lá...</p>   |
| Cây khoai tây |           | Đâm tia – phát triển củ - thu hoạch | <p> Là loại cây ưa ẩm nên nước là yếu tố rất quan trọng quyết định đến khả năng sinh trưởng cũng như năng suất của cây khoai tây. Tuần này, khu vực Tây Bắc tiếp tục có lượng mưa ở mức trung bình, do đó cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây. Hơn nữa, trong giai đoạn đâm tia – phát triển củ, yếu tố nhiệt độ cũng có tác động rất lớn tới việc hình thành củ khoai tây. Nhiệt độ thích hợp cho việc hình thành củ từ 17.0- 20.0°C, tích lũy tinh bột thì nhiệt độ thích hợp là 16.0-18.0°C. Khi nhiệt độ 21.0-25.0°C củ phát triển chậm, nhiệt độ &gt; 30.0°C quá trình hình thành củ gặp khó khăn. Nhiệt độ trong tuần này của khu vực trung bình đạt 22.5°C, nhiệt độ cao là điều kiện không thuận lợi cho việc hình thành và tích lũy tinh bột vào củ. Trong tuần, các</p> |

|                                     |  |                                     |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
|                                     |  |                                     | bệnh mốc sương, bệnh ghẻ củ, bệnh lở cổ rễ... tiếp tục phát sinh gây hại trên cây khoai tây.   |
| Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi) |  | Phát triển lộc – ra hoa - quả non   | Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 18.5 - 26.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 84.7mm. Trong thời kỳ ra hoa - quả non, cây ăn quả có múi rất cần nước, việc thiếu nước trong thời kỳ này sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng ra hoa và đậu trái của cây. Nhiệt độ trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, tuy nhiên, lượng mưa có tăng mạnh so với tuần trước nhưng vẫn ở mức trung bình, do đó, vẫn cần tưới bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: rệp sáp, nhện đỏ, bệnh vàng lá thối rễ... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ăn quả có múi. |
| Cây nhãn                            |  | Phát triển lộc - hoa                | Tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước, lượng mưa trong tuần đạt 84.7mm, một số ngày xuất hiện mưa phùn. Đây là điều kiện không thuận lợi cho việc ra hoa trên cây nhãn. Trong thời kỳ ra hoa, bất gặp mưa phùn (nước mưa mang nhiều axit sẽ khiến các hạt phấn bị rửa trôi, bị bết lại... gây ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn). Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên cây nhãn (đặc biệt là đối tượng bệnh sương mai, bọ xít nâu). Người dân cần phải thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh và chủ động phòng trừ kịp thời.   |
| Cây chè                             |  | Chăm sóc – phát triển búp – thu hái | Nhiệt độ trong tuần này của khu vực Tây Bắc khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè, tuy nhiên lượng mưa trong tuần ở mức trung bình, do đó, người dân vẫn cần tưới bổ sung cho cây chè để bảo đảm cây chè sinh trưởng tốt nhất, tạo điều kiện cho búp chè phát triển mạnh, tăng năng suất chè thu hoạch được. Trong tuần, các đối tượng gây hại trên cây chè cần chú ý: bọ xít muỗi, nhện nâu đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ...   |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 13.0- 33.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5-24.5°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ

cơ bản biến động không nhiều so với tuần này, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm. Các cây trồng trong thời gian tới cần được chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng (điều tiết hợp lý lượng nước tưới theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng của từng loại cây trồng); chủ động theo dõi và kịp thời phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại (bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn ... phát sinh gây hại trên cây lúa; sâu xám, sâu khoang... phát sinh gây hại trên cây ngô, lạc...); tích cực các biện pháp chăm sóc, bón phân giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi và sâu bệnh hại.

**THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**