



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 20.7 - 26.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 19.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 6.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 22.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 6.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 25.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-20/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; Từ ngày 14/3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.5	16.3	18.4	41.9
Trong tuần	26.6	20.7	23.7	19.4
Tuần tới	25.0-28.0	17.0-20.0	21.0-24.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng - trổ	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 20.7-26.6°C, lượng mưa trong tuần đạt 19.4mm. Điều kiện lượng mưa trong tuần tương đối thấp không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa, người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lúa. Cụ thể, cây lúa trong giai đoạn đẻ nhánh cần tưới “Uớt – khô xen kẽ” (trong các đợt lấy nước cần kết hợp bón phân bổ sung để thúc cho cây lúa đẻ nhánh khỏe và tăng nhánh hữu hiệu); cây lúa trong giai đoạn đứng cái - trổ tuyệt đối không để chân ruộng khô, cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5cm để cây lúa phát triển một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, cần chú ý theo dõi và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh phát sinh

			gây hại trên cây lúa: bệnh đạo ôn, rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm...
Cây ngô	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá - trổ cờ	Tuần 1 tháng 3, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 23.7°C, nhiệt độ tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô, Tuy nhiên, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp (19.4mm) là điều kiện không thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng. Trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng nhu cầu về nước của cây ngô, người dân cần tưới thêm nước bổ sung. Ngoài ra, cần kết hợp xới xáo và bón phân để giúp cho cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh. Sâu keo mùa thu, sâu xám, rệp hại cờ... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần.
Cây lạc	Đông xuân (2021-2022)	Ra hoa - đâm tia - tạo quả	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần tăng mạnh so với tuần trước khiến cho cây lạc sinh trưởng tốt hơn, tuy nhiên, lượng mưa trong tuần này giảm mạnh khiến cho cây lạc bị thiếu nước. Trong thời kỳ ra hoa, cây lạc rất cần nước. Do đó, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung (có thể tháo nước ngập 2/3 rãnh ruộng để tưới ngấm đều rồi tháo cạn). Ngoài ra, cần kết chú ý xới xáo đất kết hợp vun gốc và theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại trên cây lạc: sâu ăn lá, bệnh héo rũ, bệnh héo xanh vi khuẩn... khi thấy mật độ sâu gây hại còn thấp có thể sử dụng biện pháp thủ công để tiêu diệt: bắt tay, dùng vợt chao... khi mật độ sâu gây hại vượt quá nhiều cần nhanh chóng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt.
Cây sắn		Mọc mầm – cây con – phát triển thân lá	Trong tuần này, lượng mưa của khu vực Trung Trung Bộ giảm (lượng mưa tuần này đạt 19.4mm, giảm 22.5mm so với tuần trước). Lượng mưa thấp khiến cho cây sắn sinh trưởng chậm. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sắn. Bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần cần được chú ý.
Cây ăn quả có		Thu hoạch – chăm sóc sau	Cây ăn quả có múi trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế

múi		thu hoạch	tăng, lượng mưa giảm. Có thể nhận thấy, thời tiết tuần này của khu vực khá thuận lợi cho việc thu hoạch cũng như công tác dọn dẹp vệ sinh lại vườn cây sau thu hoạch. Người dân cần tranh thủ thời tiết để thu hoạch các diện tích còn lại, sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh lại vườn cây, tưới nước kết hợp bón phân giúp cho cây ăn quả có múi nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch quả.
Cây cao su		Chăm sóc	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 20.7-26.6°C, lượng mưa trong tuần đạt 19.4mm. Sâu bệnh gây hại trên cây cao su trong tuần tiếp tục là các đối tượng: bệnh xì mũ, loét sọc miệng cao, bệnh thán thư...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0 – 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa là 30.0-60.0mm. Do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có tiếp tục có lượng mưa thấp. Trong quá trình chăm sóc, các cây trồng cần được chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh, đồng thời theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng để kịp thời phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng