



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 1 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp



Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 3 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 15.1 - 22.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.8°C, tổng lượng mưa là 49.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 8.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 6.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 33.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 16.3\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-13/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 14-17/03, mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 18-20/3, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^\circ\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	14.3	8.4	11.3	15.4
Trong tuần	22.4	15.1	18.8	49.3
Tuần tới	22.0-25.0	10.0-13.0	16.0-19.0	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Lúa cây (cây - hồi xanh - đẻ nhánh) Lúa sạ (đẻ	Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực Việt Bắc tăng mạnh so với tuần trước (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 7.5°), thời tiết ẩm hơn khiến cho cây lúa sinh trưởng tốt

		nhánh - để rộ)	hơn, người dân cần tranh thủ tình hình thời tiết để chăm sóc giúp cây lúa nhanh chóng phục hồi sau thời kỳ rét đậm rét hại. Lượng mưa trong tuần này của khu vực cũng cùng xu thế tăng với nhiệt độ, tuy nhiên lượng mưa trong tuần của khu vực vẫn ở mức thấp (49.3mm) nên vẫn cần tưới bổ sung thêm nước cho cây lúa. Trong các đợt tưới nước cần kết hợp bón phân cân đối và hợp lý để cây lúa nhanh chóng phục hồi và sinh trưởng khỏe mạnh. Trong tuần, cây lúa chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh đạo ôn lá, bệnh vàng lá, bọ trĩ...
Cây ngô	Xuân 2022	Gieo trồng – 5-7 lá – xoáy nõn	Cây ngô trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong các giai đoạn gieo trồng – 5-7 lá, một số diện tích đã chuyển sang giai đoạn xoáy nõn. Trong giai đoạn này, cây ngô chịu rét và chịu hạn tốt hơn cả. Do đó, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Tuy nhiên, để bảo đảm cây ngô sinh trưởng tốt hơn, trong điều kiện thủy lợi cho phép, người dân nên tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu xám...
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – 4 lá - phân cành	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 15.1-22.4°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 49.3mm. Trong điều kiện thời tiết như trên, cần chú ý tưới thêm nước kết hợp xới xáo ruộng đất kết hợp bón thêm phân Đạm và Kali để thúc cho cây lạc sinh trưởng khỏe mạnh và nhanh chóng phục hồi. Bên cạnh công tác chăm sóc giúp cây lạc phục hồi sau thời kỳ rét đậm rét hại, người dân cần chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu xanh da láng, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh vi khuẩn...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển lộc – ra hoa	Tuần 1 tháng 3, cây ăn quả có múi trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc – ra hoa. Nhiệt độ của khu vực trong tuần này đạt 18.8°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 49.3mm. Trong thời kỳ ra hoa, cây ăn quả có múi cần nhiều nước. Do đó, có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực không thực sự thuận lợi cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong quá trình chăm sóc, lưu ý tưới thêm nước kết hợp bón

			phân thúc để cho hoa ra đồng loạt và tăng khả năng đậu quả. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu vẽ bùa, bệnh thán thư, bệnh vàng lá thối rễ...
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng mạnh so với tuần trước, lượng mưa trong tuần này có tăng tuy nhiên lượng mưa vẫn ở mức khá thấp. Tương tự như đối với cây ăn quả có múi, cây vải trong thời kỳ ra hoa cần rất nhiều nước. Với lượng mưa của khu vực trong tuần như trên không đủ đáp ứng nhu cầu của cây vải. Do đó, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây. Ngoài ra, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải (đặc biệt là đối tượng bọ xít nâu) để kịp thời phòng trừ.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Trong tuần này, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 15.1-22.4°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 49.3mm. Nhiệt độ và lượng mưa thấp là điều kiện không thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè, khiến cho tốc độ phát triển búp trên cây chè bị chậm lại, gây ảnh hưởng tới năng suất chè thu hoạch được. Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, sâu đục thân... là một số đối tượng gây hại chính trên cây chè trong tuần.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0 - 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.0-19.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-70.0mm. Trong quá trình chăm sóc, các cây trồng cần được chú ý điều tiết nước hợp lý để bảo đảm nhu cầu nước của từng loại cây trồng khác nhau; chủ động bón phân cân đối và hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh; tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để các biện pháp phòng trừ phù hợp và hiệu quả đối với từng loại cây trồng.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng