



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 3 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 17.6 - 23.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.7°C, tổng lượng mưa là 14.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 34.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 4.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 40.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/3, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày 24/3 có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 22-23/3 trời rét. Từ đêm 24-26/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 26/3-01/4, có mưa rào và dông rải rác tập trung từ đêm 26-27/3, sau có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 27/3-01/4 đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.4	15.1	18.8	49.3
Trong tuần	23.9	17.6	20.7	14.6
Tuần tới	30.0-33.0	17.0-20.0	23.5-26.5	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Hồi xanh - đẻ nhánh - cuối đẻ nhánh - đứng cái	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 17.6-23.9°C, nền nhiệt độ trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lúa, cây lúa trong tuần sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, trong tuần, khu vực Việt Bắc có lượng mưa tương đối thấp (đạt 14.6mm), do đó, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa. Ngoài ra, trong quá trình tưới cần chú ý bón phân cân đối - hợp lý kết hợp theo dõi và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa (đối tượng bệnh đạo ôn lá, chuột, bệnh khô vằn...)
Cây ngô	Xuân 2022	Cây con - phát triển thân lá -	Tuần 2 tháng 3, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần trước (trung bình tăng 1.9°C), trong khi đó, lượng mưa trong tuần này

		xoáy nõn	của khu vực giảm đáng kể so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 14.6mm, giảm 34.7mm). Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần này của khu vực khá thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng, tuy nhiên trong điều kiện lượng mưa tương đối thấp, để đảm bảo cho cây ngô sinh trưởng tốt, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Thời tiết ẩm lên kéo theo các đối tượng sâu bệnh gia tăng gây hại trên cây ngô cần chú ý: sâu keo mùa thu, sâu cuốn lá, sâu xanh ăn lá, sâu đục thân...
Cây lạc	Xuân 2022	Cây con – phát triển thân lá	Nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 20.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 14.6mm. Cây lạc Xuân trong khu vực đang trong giai đoạn cây con – phân cành, các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết mưa không đáng kể.
Cây đậu tương		Cây con	Cây đậu tương sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 21-34°C. Nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 17.6-23.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 14.6mm. Điều kiện nhiệt độ cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây đậu tương, tuy nhiên lượng mưa của khu vực rất thấp. Do đó, trong quá trình chăm sóc, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây đậu tương. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng phát sinh gây hại trên cây đậu tương: sâu xám, đòi đục thân, bệnh lở cổ rễ...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển lộc – ra hoa	Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc – ra hoa. Ở giai đoạn này, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, tuy nhiên không chịu được úng. Trong điều kiện thời tiết trong tuần với lượng mưa rất thấp, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi. Khi tưới, cần tưới đủ ẩm, tưới thường xuyên, không nên tưới quá đẫm khiến cho cây bị úng nước. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, bệnh thán thư, rầy mềm...
Cây vải		Phát triển lộc - hoa - quả non	Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực khá phù hợp cho cây vải sinh trưởng. Trong tuần hầu như không có mưa cũng là điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ phấn và đậu quả trên cây

			vải. Tuy nhiên, mưa ít khiến cho nhu cầu về nước của cây vải không được bảo đảm, trong khi giai đoạn này cây vải cần khá nhiều nước. Vì vậy, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây vải. Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, cần chú ý đối tượng bọ xít nâu phát sinh gây hại trên cây vải trong giai đoạn này.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Cây chè trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong các giai đoạn chăm sóc – phát triển búp – thu hái. Trong tuần này, thời tiết của khu vực ẩm hơn là điều kiện thuận lợi cho cây chè sinh trưởng, tuy nhiên, lượng mưa trong tuần rất thấp khiến cho tốc độ phát triển búp trên cây chè bị chậm lại, gây ảnh hưởng lớn tới năng suất chè thu hoạch được. Trong tuần, cây chè chịu tác động bởi các đối tượng gây hại: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, sâu đục thân...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0- 33.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.5-26.5°C, tổng lượng mưa là 40.0-70.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa ở mức trung bình. Các cây trồng cần được chú ý tranh thủ thời tiết ẩm lên để chăm sóc, bón phân cân đối giúp cây trồng nhanh chóng phục hồi; chủ động nguồn nước để bổ sung cho từng loại cây trồng theo nhu cầu; ngoài ra, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên từng loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng