



Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 4 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 20.5 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.9°C, tổng lượng mưa là 72mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 11.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 24 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 17mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Những ngày đầu tháng 5/2022, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt Gió mùa Đông Bắc, từ ngày 01/5 trời rét tại khu vực vùng núi phía Bắc. Trong hai ngày 01-02/5 trên đa phần diện tích cả nước có mưa rào và dông diện rộng, có mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.9	18.6	22.2	60.6
Trong tuần	29.4	20.5	24.9	72.0
Tuần tới	30.0-33.0	18.0-21.0	24.0-27.0	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Làm đòng - trổ - phơi màu - chắc xanh	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 20.5-29.4°C, có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lúa trong tuần. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 72.0mm, tập trung chủ yếu vào các ngày cuối tuần khiến một số diện tích lúa đang trong giai đoạn trổ bị ảnh hưởng, những ngày đầu và giữa tuần lượng nước mưa cung cấp cho cây lúa không bảo đảm được nhu cầu về nước của cây. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trong tuần cần chú ý: bệnh đạo ôn lá - cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt....

Cây ngô		Trở cò - phát triển bắp	Tuần 3 tháng 4, cây ngô trong khu vực Tây Bắc hiện trong các giai đoạn trở cò - phát triển bắp. Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước. Thời tiết ẩm lên khiến cho hầu hết các loại cây trồng đều sinh trưởng tốt hơn trong đó có cây ngô. Tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 72.0mm, lượng mưa phân bố không đồng đều, mưa nhiều vào các ngày cuối tuần gây ảnh hưởng đến một số diện tích ngô đang trở cò và khiến một số diện tích ngô bị đổ ngã do mưa to và gió lớn. Trong tuần này, cây ngô tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn... người dân cần chú ý theo dõi và kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
Cây lạc	Xuân 2022	Ra hoa – đâm tia – phát triển củ	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 24.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 72.0mm. Cây lạc sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 24-33°C. Với điều kiện thời tiết trong tuần như trên, cây lạc sinh trưởng và phát triển khá tốt. Trong điều kiện thời tiết tốt hơn, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại gia tăng, đáng chú ý: các loại sâu ăn lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá lạc... khi phát hiện các diện tích bị nhiễm bệnh, trong trường hợp mức độ hại thấp, người dân có thể sử dụng các biện pháp thủ công (bắt tay, dùng vợt... để tiêu diệt các loại sâu ăn lá); khi mật độ sâu bệnh và diện tích nhiễm vượt quá mức kiểm soát cần nhanh chóng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt.
Cây rau các loại		Phát triển thân lá – thu hoạch	Cây rau các loại trong khu vực Tây Bắc trong tuần này tiếp tục trong các giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này khá phù hợp với sinh trưởng của cây rau các loại; lượng mưa trong tuần này của khu vực có tăng so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 72.0mm, tuần trước lượng mưa đạt 60.6mm), tuy nhiên không đáp ứng đủ nhu cầu của cây rau các loại. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tiếp tục tưới thêm nước bổ sung (lưu ý khi tưới cần tưới lúc sáng sớm hoặc chiều tối, tránh tưới lúc giữa trưa nắng sẽ khiến cây rau bị héo, thậm chí là bị chết). Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây rau các loại trong tuần: sâu xanh, sâu tơ, nhện gié...
Cây ăn		Quả non	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, trong

quả có múi (cam, quýt, bưởi)			tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 20.5-29.4°C, lượng mưa của khu vực đạt 72.0mm. Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục trong các giai đoạn quả non. Người dân cần tiếp tục chú ý tỉa bỏ bớt quả sâu bệnh, quả kém phát triển tạo điều kiện cho các quả to - khỏe mạnh sinh trưởng tốt đồng thời giúp giảm bớt áp lực nuôi dưỡng cho cây; ngoài ra, cần chú ý tưới thêm nước cho cây ăn quả có múi để bảo đảm cho cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt nhất. Trong tuần này, các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi: sâu đục thân, sâu đục quả, bệnh cháy gom, ốc sên....
Cây nhãn		Hoa - quả non	Đại đa số các diện tích nhãn trong khu vực Tây Bắc hiện trong giai đoạn quả non, một số ít diện tích còn lại trong giai đoạn hoa. Nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực tăng đáng kể so với tuần trước là điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng của cây nhãn. Trong giai đoạn chăm sóc quả non, để giúp quả non sinh trưởng khỏe mạnh và giảm tình trạng rụng trái, người dân có thể sử dụng một số chế phẩm sinh học kích trái - chống rụng quả để phun đều lên tán cây. Bọ xít nâu, sâu đục nụ hoa, bệnh sương mai... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn trong tuần cần được chú ý.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Tuần 3 tháng 4, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 24.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 72.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè tiếp trong tuần cần chú ý: bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ, sâu đục thân...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.0-33.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.0-27.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-70.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa ở mức trung bình. Các loại cây trồng trong thời gian tới cần được chú ý: chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng