



Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 4 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 20.1 - 27.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.7°C, tổng lượng mưa là 31.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 49.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 10.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 13.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Những ngày đầu tháng 5/2022, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt Gió mùa Đông Bắc, từ ngày 01/5 trời rét tại khu vực vùng núi phía Bắc. Trong hai ngày 01-02/5 trên đa phần diện tích cả nước có mưa rào và dông diện rộng, có mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.7	18.0	20.8	81.7
Trong tuần	27.4	20.1	23.7	31.8
Tuần tới	28.0-31.0	18.0-21.0	23.0-26.0	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 4 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Làm đòng - trổ - phơi màu - chắc xanh	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 20.1-27.4°C, có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây lúa trong các thời kỳ này; lượng mưa của khu vực đạt 31.8mm, phù hợp cho cây lúa trổ bông thuận lợi, tuy nhiên, lượng mưa trên không đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa trong các giai đoạn này. Do đó, trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lúa. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa: bệnh đạo ôn lá, cổ bông; bệnh khô vằn; bệnh lem lép hạt... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến bệnh và chủ động phun phòng trừ, tránh cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của

			cây cũng như gây khó khăn cho công tác phòng trừ.
Cây ngô		Xoáy nõn - trổ cờ - phát triển bắp	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong các giai đoạn xoáy nõn - trổ cờ - phát triển bắp. Nền nhiệt độ tuần này của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lúa. Trong tuần khu vực có mưa với lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 31.8mm, mưa nhỏ là điều kiện thuận lợi cho quá trình trổ cờ - thụ phấn trên cây ngô diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, với lượng mưa trong tuần như trên, cây ngô sẽ bị thiếu nước và cần được tưới bổ sung. Sâu đục thân, sâu đục bắp, sâu ăn lá... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần.
Cây lạc	Xuân 2022	Ra hoa – đơm tia – phát triển củ	Tuần 3 tháng 4, khu vực Việt Bắc có nhiệt độ trung bình tăng đáng kể so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tăng 2.9°C so với tuần trước, tuần trước nhiệt độ không khí trung bình đạt 20.8°C); lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 31.8mm. Trong điều kiện thời tiết ấm lên, cây lạc sinh trưởng tốt. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu khoang, bệnh gỉ sắt, bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả, đồng thời chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.
Cây đậu tương		Phát triển thân lá	Nhiệt độ thích hợp cho cây đậu tương sinh trưởng từ 21.0-34.0°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 23.7°C, có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần này của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây đậu tương. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 31.8mm, để bảo đảm nhu cầu về nước của cây đậu tương, người dân cần chú ý tưới bổ sung thêm nước cho cây. Có Trong tuần, cây đậu tương chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh hại: sâu xám, ruồi đục thân, sâu hại lá...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Quả non	Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn quả non. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, tuy nhiên lượng mưa trong tuần khá thấp. Trong giai đoạn quả non, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, với

			điều kiện lượng mưa trong tuần khá thấp, người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây. Trong tuần này, người dân cần tiếp tục chú ý tia bỏ bết quả sâu bệnh, quả kém phát triển tạo điều kiện cho các quả to - khỏe mạnh sinh trưởng tốt đồng thời giúp giảm bớt áp lực nuôi dưỡng cho cây. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân, sâu đục quả, bệnh chảy gôm....
Cây vải		Quả non	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực 20.1-27.4°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 31.8mm. Cây vải trong khu vực Việt Bắc trong tuần này đang trong giai đoạn quả non. Để đạt được một vụ mùa với năng suất cao, vườn vải cần chăm sóc tốt cho những trái non ngay từ khi mới hình thành. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải trong tuần: sâu đục thân, bọ xít nâu, sâu đục cuống quả... người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến và chủ động phòng trừ kịp thời, ngoài ra cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng.
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Tuần 3 tháng 4, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Lượng mưa trong tuần của khu vực khá thấp, nên cần được tưới bổ sung thêm. Sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần cần được chú ý tiếp tục là các đối tượng: bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ, sâu đục thân...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.0-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.0-26.0°C, tổng lượng mưa là 30.0-640.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa ở mức trung bình. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để bảo đảm tưới bổ sung kịp thời cho các loại cây trồng (đặc biệt là cây lúa); khi thời tiết ấm lên, cần tăng cường các biện pháp chăm sóc và bón phân cân đối - hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi, tạo tiền đề cho năng suất cao; theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng