



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 5 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 23.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 48.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 14.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 176.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 25.0$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ 25/5-01/6, có mưa rào và dông trong ngày 25/5, sau đó từ ngày 26/5 có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.3	21.5	24.9	52.4
Trong tuần	29.6	23.2	26.4	48.9
Tuần tới	31.0-34.0	21.0-24.0	26.0-29.0	150.0-300.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Trỗ - phơi màu - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 23.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 48.9mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32 độ C, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần phù hợp cho lúa phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 150-300mm, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ 23-29 độ C, có thể nhận thấy nhiệt độ tuần sau tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển, tuy nhiên dự báo lượng mưa lớn nên người dân cần chủ động

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			tia bót cành sâu bệnh và gia cố nền đất để tăng mức độ gắn kết, hạn chế khả năng bị bật gốc cây đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 22-25 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 48.9mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu phù hợp cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 48.9mm, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả - đây là giai đoạn nhãn cần nhiều nước, có thể nhận thấy tuần này nhiệt độ và lượng mưa tương đối phù hợp cho nhãn phát triển, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc định kỳ để làm sạch lá.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 48.9mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 5 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu thống kê cho thấy tuần này điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho rau màu phát triển với nhiệt độ trung bình là 26.4 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây	Xuân	Đâm tia -	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
lạc xuân		phát triển củ	cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.2 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 48.9mm, trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều và phản ứng rất nhạy với các yếu tố đó. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần của khu vực phù hợp cho lạc phát triển giai đoạn này; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 150.0-300.0mm, số liệu dự báo tuần sau cho thấy lượng mưa dự báo lớn (150-300mm); do đó người dân cần chủ động các biện pháp tiêu thoát nước kịp thời khi mưa lớn xảy ra như: khơi thông rãnh thoát nước, làm sạch đồng ruộng, tía bớt cành khô héo và sâu bệnh đồng thời sử dụng thuốc diệt trừ sâu hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**