



Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 5 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 5 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 25.8 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 257.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 208.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 60.8\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 107.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 16.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-05/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Từ chiều tối và đêm ngày 05-08/6, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 09-11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.6	23.2	26.4	48.9
Trong tuần	29.3	25.8	27.5	257.6
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	100.0-200.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Phơi màu - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $25.8 - 29.3^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $27.5^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 257.6mm, trong tuần xuất hiện nhưng ngày có tổng lượng mưa lớn kéo dài gây ngập úng đồng ruộng nên người dân cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp tiêu thoát nước kịp thời như bơm tiêu, khơi thông cống rãnh thoát nước; cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ $25.8 - 29.3^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình $27.5^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 257.6mm, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ $23-29^{\circ}\text{C}$ ,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			có thể nhận thấy tuần 3 tháng 5 xuất hiện ngày mưa lớn kéo dài do đó cần tiến hành tía thưa cành khô, cành bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho quả phát triển cũng như hạn chế gãy cành khi mưa lớn xảy ra đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là độ 22-28 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.8 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 257.6mm, có thể nhận thấy lượng mưa trong tuần cao với những ngày mưa lớn gây ngập úng đồng ruộng, người dân cần có biện pháp thoát nước cho ruộng ngô kịp thời tránh tình trạng úng ngập diện rộng đồng thời chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.8 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 257.6mm, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả - đây là giai đoạn nhãn cần nhiều nước, tuy nhiên tuần này có những trận mưa với cường độ mưa lớn kéo dài do đó người dân cần tía cành khô, cành bị sâu bệnh, thu hoạch trên những cây nhãn chín sớm đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: cần cắt tía, thu gom và đem đi tiêu hủy (đốt) những cành, lá, hoa có triệu chứng bệnh.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.8 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 257.6mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 5 thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau		Phát triển	Số liệu thống kê cho thấy tuần này có lượng mưa

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
màu		thân lá - thu hoạch	lớn với những ngày mưa kéo dài, do đó người dân cần chủ động tháo nước cho diện tích rau màu đặc biệt diện tích đang ở thời kỳ cây phát triển thân lá để giảm thiểu tối đa thiệt hại ngập úng do mưa lớn gây ra đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép và đúng liều lượng.
Cây lạc	Xuân	Đâm tía - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.8 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 257.6mm, trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều và phản ứng rất nhạy với các yếu tố đó. Trong tuần xuất hiện ngày mưa lớn, do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước cho ruộng lạc để giảm thiểu thiệt hại do úng ngập gây ra đồng thời cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo Đồng Bằng Bắc Bộ dự báo tiếp tục có tổng lượng mưa lớn do đó cần chủ động bơm tiêu kịp thời tránh úng ngập diện rộng đồng thời sử dụng biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**