



Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 19 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 64.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 7.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 17.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 50.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-15/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Từ ngày 15/5 trời chuyển mát. Từ ngày 16-21/5, có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 17 trưa chiều trời nắng.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.4	20.5	24.9	72.0
Trong tuần	26.3	19.0	22.6	64.2
Tuần tới	30.0-33.0	20.0-23.0	25.0-28.0	80.0-150.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Trỗ - phơi màu - đò đũa	Tuần 1 tháng 5, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm đáng kể so với tuần trước (với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 2.3°C), lượng mưa trong tuần này giảm nhẹ so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 64.2mm, giảm 7.8mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực với nền nhiệt độ thấp, lượng mưa ở mức trung bình, không thực sự thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý bổ sung thêm nước cho cây lúa, đặc biệt là các diện tích lúa từ thời kỳ trỗ bông; ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép, nên duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5.0cm để cây lúa sinh trưởng tốt nhất. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn... người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ

			tránh để sâu bệnh phát triển mạnh gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa cũng như gây khó khăn cho công tác phòng trừ.
Cây ngô		Trở cò - thâm râu - phát triển bắp	Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc trong tuần của khu vực có xu thế giảm đáng kể, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 64.2mm, giảm 7.8mm so với tuần trước. Cây ngô phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 24.0-30.0°C. Trong điều kiện nhiệt thấp, cây ngô sinh trưởng chậm hơn, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của bắp ngô thành phẩm khi thu hoạch. Trong tuần, cây ngô tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các đối tượng: sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp hại...
Cây lạc	Xuân 2022	Đâm tia - phát triển củ	Nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 22.6°C, thấp nhất đạt 19.0°C. Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến quá trình đâm tia và tia hình thành củ, ngoài ra nhiệt độ thấp khiến cho cây lạc sinh trưởng chậm khiến cho quá trình tích lũy chất khô để hình thành củ cũng bị ảnh hưởng dẫn đến củ lạc khi thu hoạch không đạt chất lượng cao cũng như kéo dài thời gian cho thu hoạch củ. Trong tuần, lượng mưa của khu vực đạt 64.2mm cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây lạc. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần cần chú ý: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá, sâu ăn lá...
Cây rau các loại		Phát triển thân lá – thu hoạch	Trong tuần này, cây rau các loại tiếp tục trong các giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực có xu thế giảm, trong điều kiện thời tiết như trên, cây rau các loại sinh trưởng chậm hơn. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tiếp tục tưới thêm nước kết hợp bón phân hợp lý để giúp cây rau phát triển tốt. Trong tuần, cây rau các loại tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh gây: sâu xanh, sâu tơ, nhện gié...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng từ 23.0-29.0°C. Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 19.0-26.3°C, trung bình đạt 22.6°C. Có thể nhận thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực không thực sự thuận lợi cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 64.2mm, trong giai đoạn phát triển quả, cây ăn quả có múi cần nhiều

			nước. Do đó, trong điều kiện lượng mưa của khu vực như trên, người dân cần chú ý chủ động tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi. Sâu đục thân, bệnh sẹo, bệnh chảy gôm, ốc sên hại... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi trong tuần.
Cây nhãn		Phát triển quả	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực giảm đáng kể. Lượng mưa trong tuần này giảm nhẹ so với tuần trước. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây nhãn sinh trưởng kém hơn. Hiện tại các diện tích nhãn trong khu vực Tây Bắc đang trong giai đoạn phát triển quả. Để hạn chế việc rụng quả và giúp quả phát triển tốt, người dân cần chú ý chăm sóc bón phân và điều tiết nước hợp lý để giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh. Bên cạnh đó, cần chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại trên cây nhãn (đặc biệt là đối tượng sâu đục cuống quả và bọ xít nâu hiện đang phát sinh gây hại mạnh).
Cây chè		Chăm sóc – phát triển búp – thu hái	Tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 22.6°C, lượng mưa của khu vực đạt 64.2mm. Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Trong tuần, cây chè chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục thân, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến sâu bệnh hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.0-33.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.0-28.0°C, tổng lượng mưa là 80.0-150.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời có các biện pháp điều tiết nước hợp lý cho từng loại cây trồng; tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh; giám sát tình hình diễn biến sâu bệnh trên từng loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng