



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 23.7 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.5°C, tổng lượng mưa là 113.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 62.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 34.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 36.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình ngày 22/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 24-27/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình từ ngày 26-27/6 có nắng nóng. Từ đêm 27/6-01/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình ngày 28/6 có nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.3	23.8	26.6	176.4
Trong tuần	29.3	23.7	26.5	113.7
Tuần tới	34.0-37.0	24.0-27.0	29.0-32.0	100.0-200.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân 2021-2022	Đỏ đuôi – chín – thu hoạch	Phần lớn các diện tích lúa Đông Xuân 2021 trong khu vực Tây Bắc hiện đã cho thu hoạch xong, các diện tích còn lại phổ biến trong giai đoạn đỏ đuôi – chín – thu hoạch; Lúa Mùa 2022 chủ yếu trong giai đoạn gieo - cấy - hồi xanh. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 23.7-29.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 113.7mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa Đông Xuân cũng như chăm sóc các diện tích lúa Mùa sớm. Người dân cần tranh thủ thời tiết khô ráo để tập trung thu hoạch nốt các diện tích lúa Đông Xuân để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra. Sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp ruộng đất, tiêu
	Mùa sớm	Gieo - cấy - hồi xanh	

			trừ mầm bệnh còn sót lại để hạn chế sâu bệnh hại lây lan sang vụ sau. Sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần chủ yếu: chuột, bệnh đạo ôn lá, rầy các loại, ốc bươu vàng... gây hại trên các diện tích lúa Mùa.
Cây ngô	Hè thu	Gieo trồng – 7 lá	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy. Nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 26.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 113.7mm. Trong giai đoạn này, cây ngô yêu cầu 25.0-30.0°C; đối với cây ngô mới gieo yêu cầu độ ẩm từ 60-70%, đất đai tơi xốp, thoáng khí. Với điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần như trên, cây ngô sinh trưởng và phát triển khá tốt. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn... trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý diễn biến sâu bệnh hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
Cây lạc	Xuân 2022	Chắc củ - thu hoạch	Tuần 2 tháng 6, cây lạc trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn chắc củ - thu hoạch. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (mức biến động của nhiệt độ không khí trung bình 0.1°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này giảm đáng kể so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt 113.7mm, tuần trước lượng mưa đạt 176.4mm). Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khá phù hợp cho công tác các diện tích lạc củ đã già. Trong điều kiện thời tiết tốt, người dân cần tập trung thu hoạch các diện tích lạc củ có thể cho thu hoạch để chuẩn bị ruộng đất kịp thời gieo trồng vụ Mùa 2022 theo đúng khung lịch thời vụ. Sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần không đáng kể do phần lớn các diện tích lạc đã cho thu hoạch.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 23.7-29.3°C, khoảng nhiệt độ khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong giai đoạn phát triển quả, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 113.7mm, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung tại các khu vực thiếu nước. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: nhóm nhện nhỏ, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo, bọ

			trĩ...người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh và chủ động phòng trừ kịp thời, tránh để sâu bệnh gây hại gia tăng gây khó khăn cho công tác phòng trừ cũng như gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và chất lượng của quả khi thu hoạch.
Cây nhãn		Phát triển quả	Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho sự phát triển của cây nhãn. Tương tự như đối với cây ăn quả có múi, trong giai đoạn phát triển quả, cây nhãn cần rất nhiều nước nên cần chú ý tưới nước bổ sung cho cây nhãn trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Ngoài ra, để bổ sung dinh dưỡng nuôi quả, người dân cần chú ý bón thúc kết hợp với làm cỏ xung quanh gốc cây để hạn chế sự cạnh tranh dinh dưỡng cũng như hạn chế sự trú ngụ của sâu bệnh hại.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Cây chè sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 20.0-30.0°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 26.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 113.7mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực khá thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè cần chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.0-37.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa là 100.0-200.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Các cây trồng cần được chú ý: tập trung thu hoạch các diện tích cây vụ Đông Xuân 2021-2022 để chuẩn bị đất kịp thời gieo trồng vụ Hè thu 2022; Đối với các loại cây trồng còn lại chú ý chăm sóc, bón phân, làm cỏ, ngoài ra cần tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng