



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 23 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.9°C, tổng lượng mưa là 93.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 61.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 24.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 56.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình ngày 22/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 24-27/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 27/6-01/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.0	23.0	26.0	155.6
Trong tuần	28.8	23.0	25.9	93.8
Tuần tới	33.0-36.0	25.0-28.0	29.0-32.0	100.0-200.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân 2021-2022	Chín – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (với mức biến động của nhiệt độ không khí trung 0.1°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này giảm đáng kể so với tuần trước (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 93.8mm, giảm 61.8mm). Thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa Đông Xuân 2021-2022 đã chín cũng như công tác xuống giống gieo cấy vụ Mùa 2022. Người dân cần tranh thủ tình hình thời tiết khô ráo để thu hoạch các diện tích lúa đã chín; sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp sạch ruộng để chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa cho kịp khung lịch thời vụ. Đối với các diện tích lúa Mùa mới xuống giống, cần chú ý điều tiết nước hợp lý
	Mùa sớm Lúa mùa sớm	Gieo – 2-3 lá Bén rễ - hồi xanh	

			theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng, ngoài ra cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa (lúa Mùa): ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ... khi phát hiện cần nhanh chóng có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Cây ngô	Hè thu	Gieo trồng – 7 lá	Cây ngô vụ Hè thu trong khu vực Việt Bắc hiện đang trong giai đoạn gieo trồng – 7 lá. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực khá thuận lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Trong điều kiện thời tiết tốt, các loại sâu bệnh phát sinh gây hại nhẹ trên cây ngô: sâu keo mùa thu, sâu xám...phát sinh gây hại. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh để cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại gia tăng gây khó khăn cho công tác phòng trừ cũng như gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây.
Cây lạc	Xuân 2022	Chắc củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn chắc củ, nhiều diện tích đã cho thu hoạch xong. Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 25.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 93.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già. Người dân cần tập trung thu hoạch dứt điểm các diện tích lạc để kịp thời xuống giống vụ Hè thu sắp tới. Do phần lớn các diện tích lạc đã cho thu hoạch nên sâu bệnh gây hại trên cây lạc không đáng kể.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Tuần 2 tháng 6, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 23.0-28.8°C, điều kiện nhiệt độ khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 93.8mm, trong giai đoạn phát triển quả, cây ăn quả có múi cần rất nhiều nước nên cần được tưới bổ sung trong trường hợp mưa không đủ đáp ứng. Trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc điều tiết nước hợp lý cho cây ăn quả có múi, người dân cần chú ý bón phân thúc định kỳ để giúp cây nuôi trái; ngoài ra, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: bệnh ghẻ sẹo, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ...

Cây vải		Thu hoạch	Trong tuần này, lượng mưa của khu vực Việt Bắc giảm đáng kể so với tuần trước (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 93.8mm, lượng mưa tuần trước đạt 155.6mm). Có thể nhận thấy, thời tiết của khu vực trong tuần khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích vải đã chín quả. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch các diện tích vải đã chín. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải trong tuần chủ yếu: sâu đục cuống quả, bọ xít nâu, bệnh đốm nâu...
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Cây chè trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Nhiệt độ thích hợp cho cây chè sinh trưởng từ 20.0-30.0°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 26.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 93.8mm. Điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ....

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.0-36.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa là 100.0-200.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý: tập trung thu hoạch triệt để các diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 có thể thu hoạch được để kịp thời các công tác chuẩn bị cho vụ Hè thu 2022; Các cây trồng còn lại, chú ý công tác chăm sóc, bón phân, điều tiết nước hợp lý để giúp các cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh; Ngoài ra, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng