



Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 3 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 23.6 - 30.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27°C, tổng lượng mưa là 159.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 66mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 44.8\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 115.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 25\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/7, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 03-04/7, có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 05-07/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ đêm 08-11/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.8	23.0	25.9	93.8
Trong tuần	30.5	23.6	27.0	159.8
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	200.0-350.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 3 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Đông Xuân 2021-2022	Thu hoạch xong	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng $23.6-30.5^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 159.8mm. Trong tuần, một số nơi xảy ra mưa vừa, mưa to kèm theo giông lốc gây ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa (ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp, đổ rạp nhiều diện tích lúa đang trong thời kỳ thu hoạch). Về cơ bản, trong tuần này các diện tích lúa Đông Xuân 2021-2022 đã cho thu hoạch xong, các diện tích lúa Mùa đang trong các giai đoạn cấy - đẻ nhánh. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh gây hại trên các diện tích lúa mùa. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, cần chủ trữ nước để tưới bổ sung cho cây lúa trong thời gian tới.
	Mùa 2022	Cây – hồi xanh - đẻ nhánh	

Cây ngô	Hè thu	Gieo trồng – 9 lá	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần trước (với mức biến đổi của nhiệt độ không khí trung bình 1.9°C), lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 159.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ của khu vực trong tuần này khá phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Tuy nhiên, lượng mưa của khu vực trong tuần khá cao, cục bộ có nơi mưa to gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây ngô, nhất là các diện tích ngô mới gieo trồng. Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu cuốn lá. .. tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần.
Cây lạc	Xuân 2022	Thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 27.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 159.8mm. Trong tuần, cây lạc trong khu vực Việt Bắc đang trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần chú ý tập trung thu hoạch các diện tích lạc củ đã già để tiến hành gieo trồng vụ Hè thu 2022 (lưu ý thu hoạch vào những ngày thời tiết tạnh ráo). Do cây lạc đã cho thu hoạch nên các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc không đáng kể.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Trong giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp cho cây sắn từ 20.0-32.0°C và độ ẩm đất tương đối cao (75-85% độ ẩm đất bão hòa). Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này khá phù hợp cho sinh trưởng của cây sắn. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả có múi sinh trưởng từ 23.0-29.0°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 27.0°C, khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong giai đoạn phát triển quả, cây ăn quả có múi rất cần nước, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 159.8mm, tương đối phù hợp cho cây ăn quả có múi phát triển. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: sâu đục quả, sâu vẽ bùa, bệnh chảy gôm... người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
Cây vải		Thu hoạch	Cây ăn quả vải trong khu vực Việt Bắc trong

			tuần này tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch quả. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 23.6-30.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 159.8mm, mưa to gây khó khăn cho công tác thu hoạch các diện tích vải đã chín. Người dân cần tranh thủ tình hình thời tiết để tập trung thu hoạch các diện tích vải đã chín. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải trong tuần chủ yếu vẫn là đối tượng sâu đục cuống quả và bọ xít nâu.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Tuần 3 tháng 6, cây chè trong khu vực Việt Bắc đang trong các giai đoạn phát triển búp – thu hái. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này tương phù hợp với sinh trưởng của cây chè, cây chè đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè trong tuần: bệnh phỏng lá thối búp, bọ cánh tơ, rầy xanh...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp dao động trong khoảng 23.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình dự báo từ 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 200.0-350.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa của khu vực tương đối khá cao. Trong thời gian tới người dân cần chú ý: Khẩn trương thu hoạch các diện tích cây trồng vụ Đông cũng như các loại cây trồng khác đã cho thu hoạch, đối với các loại cây trồng còn lại cần chủ động các biện pháp để tiêu thoát nước kịp thời cho cây trồng khi có mưa lớn xảy ra, chủ động các biện pháp chống đỡ đối với các loại cây ăn quả, tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng