



Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 23.5 - 30.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 108.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 6.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 33.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 53.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 23-28/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ ngày 24/7 có nơi nắng nóng. Từ đêm 28-31/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.7	23.6	27.1	114.8
Trong tuần	30.7	23.5	27.1	108.5
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Mùa 2022	Cây – hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ	Trong tuần này, cây lúa trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong các giai đoạn cây - hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ rộ. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đương tuần trước, lượng mưa của khu vực trong tuần này có xu thế giảm không đáng kể. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ của khu vực trong tuần khá phù hợp với sinh trưởng của cây lúa, tuy nhiên, lượng mưa của khu vực không nhiều trong khi cây lúa trong các giai đoạn này đang rất cần nước, việc thiếu nước sẽ khiến cho cây lúa còi cọc và sinh trưởng kém; do đó trong quá trình chăm sóc, bên cạnh việc làm cỏ, bón phân cân đối thì người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây lúa trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc bươu vàng, sâu đục thân, tập đoàn rầy, bệnh nghệt rễ vàng lá sinh lý...

			Người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Cây ngô	Hè thu	2-4 lá, xoã nõn, trổ cờ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 23.5-30.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 108.5mm. Nền nhiệt độ của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây ngô, lượng mưa trong tuần của khu vực không nhiều (108.5mm). Đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ, đây là điều kiện tương đối thuận lợi giúp cho quá trình trổ cờ - tung phấn diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, đối với đại đa số các diện tích ngô còn lại thì lượng mưa của khu vực trong tuần không đủ đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của cây ngô nên cần được tưới bổ sung. Sâu keo mùa thu, sâu xám, châu chấu tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô cần được chú ý.
Cây lạc	Hè thu 2022	Cây con – phát triển thân lá	Tuần 2 tháng 7, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 27.1°C tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây lạc, lượng mưa của khu vực đạt 108.5mm (ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép nên tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc). Cây lạc hiện đang sinh trưởng và phát triển bình thường, Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi các đối tượng: sâu xám, sâu cuốn lá, bệnh lở cổ rễ... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại, trong trường hợp mật độ gây hại thấp người dân nên dùng các phương pháp thủ công, khi mật độ gây hại gia tăng quá cao cần nhanh chóng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ các đối tượng gây hại.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Tương tự như đối với tuần trước, tuần này thời tiết trong khu vực Việt Bắc tương đối phù hợp đối với sinh trưởng của cây sắn. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây sắn: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng, sùng trắng...
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Trong tuần này, cây ăn quả có múi trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả. Trong giai đoạn này, cây ăn quả có múi cần nhiều nước, trong điều kiện thiếu nước cây sinh trưởng kém khiến cho chất lượng quả khi thu hoạch không được bảo đảm. Tuần này, nền

			<p>nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23.5-30.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 108.5mm, lượng mưa trong tuần không nhiều nên người dân cần tưới bổ sung thêm cho cây ăn quả có múi. Nhóm nhện nhỏ, ruồi đục quả, bọ trĩ... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ăn quả có múi cần được chú ý.</p>
Cây vải		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	<p>Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đương tuần trước, lượng mưa của khu vực trong tuần này so với tuần trước giảm không đáng kể. Thời tiết của khu vực trong tuần cơ bản khá thuận lợi cho công tác thu hoạch cũng như chăm sóc các diện tích vải sau thu hoạch. Người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thu hoạch nốt các diện tích vải còn sót lại để chuyển sang giai đoạn chăm sóc giúp cây vải phục hồi sau một vụ thu hoạch quả.</p>
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	<p>Tuần 2 tháng 7, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 27.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 108.5mm. Cây chè trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Với điều kiện thời tiết của khu vực như trên, cây chè sinh trưởng và phát triển bình thường. Trong tuần, cây chè chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện...</p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-36.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-70.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tương đối cao, lượng mưa tương ở mức trung bình. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lượng mưa ở mức trung bình, các loại cây trồng cần trong thời gian tới cần được chú ý: Chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho các loại cây trồng (đặc biệt là cây lúa) trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; có các biện pháp che chắn nắng, làm mát cho cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt; tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi; theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng