



Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 8 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 22.8 - 28.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 152.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 26.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 30.4^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 22.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 32.8$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 40.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 100.8$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/9 và từ đêm 03-04/9, có mưa rào và dông rải rác. Ngày 03/9 và từ ngày 05-07/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 08-11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.0	22.5	25.7	153.8
Trong tuần	28.4	22.8	25.6	152.1
Tuần tới	31.0-34.0	21.0-24.0	26.0-29.0	40.0-70.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Đứng cái – làm đòng - trổ bông – phơi màu	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 22.8-28.4°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 152.1mm. Lúa trong khu vực Tây Bắc trong tuần này đang trong các giai đoạn cuối đẽ - đứng cái - ôm đòng - trổ - phơi màu. Có thể nhận thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp với sinh trưởng của lúa, lượng mưa trong tháng này chưa đủ đáp ứng nhu cầu của lúa. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý bổ sung nước cho lúa (bảo đảm duy trì mực nước trong ruộng từ 5.0-7.0cm đối với lúa từ khi đứng cái đến khi trổ chín, áp dụng biện pháp tưới ướt - khô xem kẽ đối với lúa từ giai đoạn đẽ nhánh - đứng cái). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn....

Cây ngô	Hè thu	Trỗ cờ - phát triển bắp – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô. Lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 152.1mm, lượng mưa trong tuần tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ngô (tuy nhiên, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn trỗ cờ - tung phần - thụ tinh thì lượng mưa nhiều sẽ khiến cho các quá trình trên bị ảnh hưởng). Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh: sâu keo mùa thu, sâu xám, rệp hại, bệnh chết héo cây con....
	Thu đông	Mới trồng – 8 lá	
Cây lạc	Hè thu 2022	Phân cành – ra hoa	Trong tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa cơ bản tương đương với tuần trước. Điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần khá thuận lợi cho sự phát triển của cây lạc. Cây lạc hiện đang sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần: rầy xanh lá mạ, sâu xám, sâu cuốn lá... người dân cần chủ động theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	Cây sắn trong khu vực Tây Bắc trong tuần này hiện đang trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, đối tượng bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn. Người dân cần tiếp tục theo dõi diễn biến của đối tượng này và chủ động thu gom và tiêu hủy các diện tích nhiễm bệnh để tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả - mọng quả	Tuần 3 tháng 8, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 22.8-28.4°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 152.1mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết tuần này của khu vực tương đối thuận lợi cho cây ăn quả có múi phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: ruồi đục quả, bọ trĩ, bệnh ghê nám, bệnh loét...
Cây nhãn		Thu hoạch	Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 25.6°C, nhiệt độ này khá thuận lợi

			cho sinh trưởng của cây nhãn. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 152.1mm. Cây nhãn trong khu vực Tây Bắc hiện tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch. Trong tuần này, khu vực tiếp tục có mưa nên khu thu hoạch cần chú ý thu hoạch khi cành lá và quả đã khô ráo. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây nhãn trong tuần: sâu đục cuống quả, bệnh đốm nâu, bệnh thán thư...
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Tuần 3 tháng 8, cây chè trong khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây chè. Trong tuần, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh phòng lá chè tiếp tục phát sinh gây hại trên cây chè cần chú ý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 21.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình từ 26.0-29.0°C, tổng lượng mưa của khu vực dao động trong khoảng 40.0-70.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tương đối cao, trong khi đó lượng mưa của khu vực tương đối thấp. Các cây trồng cần trong thời gian tới cần được chú ý: Tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch các diện tích cây trồng và hoa màu có thể cho thu hoạch; Chủ động nguồn nước và tưới bổ sung cho các loại cây trồng; Có các biện pháp che chắn và làm mát cho cây trồng trong những ngày thời tiết nắng nóng; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc cho các loại cây trồng theo từng thời kỳ sinh trưởng; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng và có biện pháp trừ kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng