



Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 1 tháng 8 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 22.9 - 28.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 144.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 71.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 35.2\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 16.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 13-16/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17-21/8, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.0	23.9	26.4	72.5
Trong tuần	28.7	22.9	25.8	144.2
Tuần tới	31.0-34.0	23.0-26.0	27.0-30.0	100.0-200.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Hồi xanh - đẻ nhánh - đứng cái - phân hóa đòng	Tuần 1 tháng 8, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng $22.9-28.7^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực đạt 144.2mm. Trong các giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây lúa từ $25.0-32.0^{\circ}\text{C}$ , bảo đảm đầy đủ nước và dinh dưỡng. So với tuần trước, tuần này lượng mưa của khu vực đã tăng khá nhiều, tuy nhiên để bảo đảm nhu cầu về nước đối với cây lúa để giúp cây lúa sinh trưởng tốt nhất, người dân cần chú ý bổ sung thêm nước cho cây (bảo đảm duy trì mực nước trong ruộng từ 5-7cm đối với các diện tích lúa đứng cái trở đi). Trong tuần, do điều kiện thời tiết tốt các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa gia tăng, đáng chú ý: rầy các loại, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn lá... Người dân cần hết sức lưu ý diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Cây ngô	Hè thu	Xoáy nõn - trở cờ - phát triển bắp	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 25.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 144.2mm. Cây ngô trong khu vực Việt Bắc hiện trong nhiều giai đoạn khác nhau. Điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này cơ bản khá phù hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý làm cỏ, vun gốc kết hợp bón phân hợp lý để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh, tạo tiền đề cho năng suất cao. Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu đục thân, rệp hại... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần cần chú ý.
	Thu đông	Mới trồng – 3 lá	
Cây lạc	Hè thu 2022	Cây con – phân cành	Trong tuần này, các diện tích trong khu vực Việt Bắc đang trong các giai đoạn cây con - phân cành. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc sinh trưởng từ 24.0-33.0°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực khá thuận lợi cho sinh trưởng của cây lạc. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu cuốn lá, rầy xanh, bệnh lở cổ rễ... người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phun phòng trừ các đối tượng gây hại.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Là loại cây có khả năng chịu hạn tốt, tuy nhiên độ ẩm cao khiến cho cây sắn sinh trưởng thuận lợi hơn. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 25.0-32.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 144.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho sự phát triển của cây sắn. Trong tuần, bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn. Do đó, người dân cần tiếp tục kiểm tra và phát hiện những cây bị nhiễm bệnh để tiến hành thu gom và tiêu hủy triệt để, tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng.
Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi)		Phát triển quả	Tuần 1 tháng 8, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 26.5°C, lượng mưa của khu vực đạt 144.2mm. So với tuần trước, tuần này điều kiện thời tiết tốt hơn, cây ăn quả có múi sinh trưởng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để bảo đảm cho cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt nhất, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi ở các khu vực thiếu nước. Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có

			múi: nhóm nhện nhỏ, ruồi đục quả, bệnh loét sẹo...
Cây vải		Chăm sóc sau thu hoạch	Trong tuần này, toàn bộ các diện tích vải đã chuyển sang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch. Sau thu hoạch, cây vải yếu nhất nên rất cần được phục hồi. Trong tuần này, thời tiết của khu vực Việt Bắc tương đối phù hợp cho công tác chăm sóc vườn cây sau thu hoạch. Trong giai đoạn này, người dân cần tiến hành công việc tỉa bỏ bớt các cành già yếu, cành sâu bệnh, cành tăm trong tán để giúp cây phân hóa mầm nhanh và hạn chế sâu bệnh; sau khi tỉa cành, cần tiến hành bón phân để cây vải nhanh chóng phục hồi tạo đà tiếp sức cho vụ vải tiếp theo, đồng thời tiến hành phun thuốc trừ sâu để phòng trừ các đối tượng: sâu đo xanh, sâu cuốn lá, nhện đỏ... rất có khả năng phát sinh gây hại.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Cây chè trong khu vực Việt Bắc trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Tuần này, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần trước, trong khi đó, lượng mưa tuần này của khu vực tăng đáng kể. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây chè sinh trưởng và phát triển tốt hơn tuần trước. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè cần chú ý trong tuần: rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23.0-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 100.0-200.0mm. Mưa to xảy ra cục bộ rất có khả năng xảy ra ngập úng. do đó, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết. đồng thời thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời có các biện pháp ứng phó khi mưa lớn xảy ra. Đồng thời, cần tăng cường công tác giám sát và phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng