


Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 9 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 9 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 23.8 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 47.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 55.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 15.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 27.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Từ ngày 25/9-01/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ 27-29/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. (Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.1	23.5	25.8	103.6
Trong tuần	28.9	23.8	26.4	47.7
Tuần tới	30.0-33.0	26.0-29.0	28.0-31.0	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa mùa	Trà sớm	Chín sữa - chín sấp	Theo số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 23.8-28.9°C, tổng lượng mưa là 47.7mm. Trong giai đoạn chín sữa, cây lúa rất cần nước nên không được để chân ruộng bị khô. Do đó, trong điều kiện lượng mưa trong tuần tương đối thấp, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây lúa. Bên cạnh đó, cần ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu, sâu đục thân 2 chấm...
Cây vải		Phát triển lộc	Cây vải hiện đang trong thời kỳ phát triển lộc. Đây là giai đoạn rất quan trọng quyết định đến sự thành công của vụ vải sắp tới. Trong giai đoạn này, cần chăm sóc cẩn thận để cây vải có thể bật lộc thu trong đúng thời điểm. Trong tuần này, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 26.4°C, lượng mưa của khu vực đạt 44.7mm.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			Điều kiện nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây vải, tuy nhiên, lượng mưa trong tuần tương đối thấp nên cần được tưới tưới bổ sung để bảo đảm nhu cầu về nước của cây vải. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải cần chú ý: sâu đo ăn lộc non, sâu đục gân lá, sâu xanh ăn lá....
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Trong giai đoạn phát triển quả, cây ăn quả có múi cần rất nhiều nước, việc thiếu nước trong thời kỳ này sẽ khiến cho việc phát triển quả và chất lượng quả khi thu hoạch bị giảm sút. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, lượng mưa trong tuần này của khu vực tương đối thấp (44.7mm). Để bảo đảm cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển tốt, bảo đảm chất lượng quả khi thu hoạch, người dân cần chủ động tưới thêm nước cho cây ăn quả có múi. Ngoài ra, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22.0-28.0°C. Trong tuần này, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ dao động từ 23.8 - 28.9°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 47.7mm. Có thể thấy điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm; đối với các diện tích ngô đã phát triển bắp, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: bệnh phấn đen, châu chấu, sâu keo mùa thu, sâu đục ...
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực trong tuần này đạt 26.4°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 47.7mm. Trong giai đoạn phát triển thân lá, nước là yếu tố quan trọng đối với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong điều kiện lượng mưa trong tuần như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây rau màu. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây rau màu trong tuần cần lưu ý: sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, bọ nhảy...
Cây sắn		Phát triển thân lá -	Trong tuần này, cây sắn trong khu vực Đông Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá – phát

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
		phát triển củ	triển củ. Tương tự như nhiều cây trồng khác, điều kiện lượng mưa trong tuần này của khu vực khá thấp nên cần được tưới bổ sung để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây sắn. Trong tuần, bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của đối tượng này, tập trung thu gom và tiêu hủy các diện tích nhiễm bệnh để tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng; ngoài ra cần chú ý các đối tượng bọ phấn trắng, rệp sáp bột hồng...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc nền nhiệt độ tương đối cao, lượng mưa ở mức trung bình. Các loại cây trồng cần được chú ý: Bảo đảm nhu cầu về nước cho các loại cây trồng theo nhu cầu của từng giai đoạn sinh trưởng; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sâu bệnh hại; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng