



Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

Số: NNHV-24/DBCL/TTUD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 09/6/2023 đến ngày 15/6/2023)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 02-08/6/2023)

Trong tuần từ ngày 02-08/6/2023, độ ẩm không khí trong khu vực 86,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 134,2°C; lượng bốc thoát hơi tiềm năng 23,3mm; lượng mưa hữu hiệu 15,4mm. Tuần qua, thời tiết mưa trải rộng toàn khu vực, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa dông. Đặc biệt từ ngày 4-7/6, khu vực xảy ra mưa lớn đi kèm dông lốc mạnh. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 23,0-35,3°C; tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 10,4 - 115,2mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02-08/6/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	81,5	86,7	84,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	60,9	73,9	134,2
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,1	13,2	23,3
Mưa hữu hiệu (mm)	5,7	10,8	15,4


Cây ăn quả đang ở giai đoạn nuôi quả - thu hoạch. Tuần qua, khu vực xảy ra mưa lớn diện rộng, kèm dông lốc mạnh đã làm cho một số diện tích cây ăn quả bị rụng quả, gãy đổ, ngập úng cục bộ, diện tích nhiễm nấm bệnh hại rễ, bệnh thán thư, thối rễ, thối quả gia tăng trong tuần qua.

Cây rau màu tuần qua đang trong nhiều giai đoạn khác nhau: nhóm bầu, bí, dưa đang trong giai đoạn ra hoa - đậu trái; nhóm rau ăn lá đang trong giai đoạn phát triển thân lá thu hoạch. Thời tiết mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to đã gây ngập úng, ngã đổ, thiệt hại một số diện tích rau, đồng thời một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: rầy mềm, sâu vẽ bùa, sâu tơ,... phát sinh và gia tăng gây hại cho cây rau màu.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/6/2023 đến ngày 15/6/2023)



Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng thoát hơi tiềm năng

b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) dự báo trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 52 - 56°C, tích ôn hữu hiệu dự báo trong 04 ngày sau dao động trong khoảng 70 - 76°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại tất cả các tỉnh trong khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ, dao động trong khoảng từ 4,5-15,0%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo 03 ngày đầu dao động trong khoảng 13 - 14mm, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 16 - 19mm. Tuần tới, các tỉnh trong khu vực có khả năng đều có mưa, riêng tại tỉnh Long An sẽ nhận được tổng lượng mưa hữu hiệu cao hơn so với các tỉnh còn lại. So với cùng kỳ năm trước, lượng mưa hữu hiệu tại các tỉnh trong khu vực có xu thế cao hơn so với cùng kỳ từ 50-100%.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động khoảng 84-91%. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 23mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng có thể cao hơn khoảng 10-20% so với nhu cầu.

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	85,0 - 91,7	84,0 - 90,5	84,4 - 91,0
Tích ôn hữu hiệu (°C)	51,6 - 56,1	70,4 - 76,4	122,5 - 132,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,7 - 9,8	12,9 - 13,1	22,5 - 23,0
Mưa hữu hiệu (mm)	13,2 - 14,1	16,0 - 18,8	30,1 - 32,8
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	10,2 ÷ 20%		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo thời tiết khu vực tuần tới: từ ngày 9-12/6, sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (mưa tập trung vào chiều tối); từ ngày 13-15/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ không khí dự báo trong tuần dao động trong khoảng 25 - 32°C, tổng lượng mưa dự báo trong tuần dao động trong khoảng 58 - 109mm (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Cây ăn quả chủ yếu ở giai đoạn nuôi quả - thu hoạch. Dự báo tuần tới khu vực tiếp tục có mưa to đến rất to, cần lưu ý cắt tia cành, chống đỡ thân cành quả chắc chắn nhằm hạn chế cây ngã đổ, rụng quả, đồng thời, nạo vét khơi thông các rãnh giúp vườn cây ăn quả thoát nước kịp thời và nhanh chóng khi có mưa to, không được để đọng nước khu vực gốc cây rất dễ phát sinh các loại nấm bệnh gây hại rễ, làm thối rễ, cây bị vàng lá, rụng lá rụng quả. Sau đợt mưa kéo dài ngày cần phun các loại thuốc gốc đồng để phòng trừ nấm bệnh tấn công, quét vôi vùng thân gốc cây để diệt bào tử nấm, thâm nhập nấm bệnh lên cây; Lưu ý bệnh thán thư, vàng lá thối rễ, nứt thân xì mù, thối trái gia tăng gây hại.

Tuần tới, rau màu trong giai đoạn sinh trưởng - thu hoạch. Với thời tiết mưa to diện rộng, người dân cần có biện pháp che chắn cho vườn rau, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ. Ngoài ra, thời tiết tuần tới thuận lợi cho cho sâu tơ, sâu vẽ bùa, bọ nhảy, rầy mềm,... tiếp tục phát sinh diện tích gây hại; nên thăm vườn thường xuyên, tiến hành tỉa bỏ các lá già, lá nhiễm bệnh và dọn các loại cỏ trong vườn để cắt đứt nơi trú ngụ của sâu bệnh; bón phân cân đối và hợp lý theo từng giai đoạn phát triển của rau, không bón thừa phân đạm; lưu ý thời gian cách ly sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, khẩn trương thu hoạch các vườn rau đã đến kỳ thu hoạch để giảm thiệt hại và ảnh hưởng bởi mưa to, gió lớn.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 16/6/2023

Tin phát lúc: 17h00

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phạm Thị Kim Phụng